


# KALVØ I GENNER BUGT

en ø-floraliste med noter

af

Erik Wessberg



## KALVØ I GENNER BUGT - EN Ø-FLORALISTE MED NOTER


Genner Bugt ligger ved Lille Bælt ca. 10 km nordøst for Åbenrå og ved nordsiden af Løjt Land. Inderst i bugten ligger Kalvø, der i vore dage via en dæmning er forbundet med fastlandet ved Genner Strand. Øen er knap 19 ha stor og havde indtil omkring 1870 rummet et skibsværft (Dahl 1976), hvis hovedbygning og længer, der bruges til beboelse, endnu eksisterer i bedste velgående. Ved øens østside ligger nogle få fritidshuse. Det menes, at der ved nordvest-hjørnet af Kalvø i fordums tid har ligget en borg. Dette er dog endnu hverken af- eller bekræftet (Trap 1965). I sommertiden er Kalvø stærkt besøgt, idet den er et eftertragtet udflugtsmål for såvel sejlere som bilister.

Over halvdelen af øens areal optages af en centralt- og sydligt beliggende, sandet morænekold. På alle sider er den omgivet af marint forland, som for størstepartens vedkommende består af strandenge, der dog oftest er af minimal bredde - til tider under 1 meter. Ved den nordvestlige del, ved vestsiden og især ved sydsiden findes rørsumpområder, ofte smalle og ikke skarpt afgrænsede. Tidligere har Kalvø muligvis bestået af to øer, der har været adskilt af et smalt sund beliggende ved morænekoldens nordlige side. Dette område er øens lavestliggende, og da det er gennemsåret af øst-vestgående grøfter desuden det mest fugtige område på øen. Umiddelbart syd herfor findes der en lille klat skov.

### Rødknæ (*Rumex acetosella*)

er en af karakterplanterne på den tørre og sandede morænekold.





Kalvø

Kort- og Matrikelstyrelsen


1. maj 1990. 1: ca. 10000

Moræneknolden ligger hen som et fladt overdrev bræmmet af op til ca. 3 meter høje, kratklædte skrænter. Ved foden af skrænten er øen rundt anlagt en spadseresti.

### Vegetationen på Kalvø

Moræneknolden består af morænesand. Den frodigste vegetation findes i nord, medens den centrale og sydlige del vegetationsmæssigt afspejler jordens sandede bonitet, idet mosser og laver dominerer. De urter, der findes hér, er oftest svagt udviklede med et sygeligt udseende. På alle sider er dette "golde" område omkranset af krat, hhv. den lille klat skov mod nord og krattet på skrænterne øen rundt.

Blandt de relativt mange forskellige urter her på moræneknolden kan nævnes Alm. Kællingetand (*Lotus corniculatus*), Muse- Smalbladet og Vår-Vikke (*Vicia cracca*, *V. angustifolia* og *V. lathyroides*), Bitter Bakkestjerne (*Erigeron acre*), Gul, Hvid, Fin og Hare-Kløver (*Trifolium campestre*, *T. repens*, *T. dubium* og *T. arvense*) og Rødknæ (*Rumex acetosella*) samt 3 mindre almindelige arter: Liden Museurt (*Filago minima*), Skov-Fladbælg (*Lathyrus sylvestris*) og den forvildede, men tilsyneladende naturaliserede Pomerans-Høgeurt (*Hie-*



Lav Ranunkel (*Ranunculus repens*)  
findes flere steder på Kalvø, men især er den hyppig i det grøftede område mellem moræneknolden og bygningerne ved øens nordside.

racium aurantiacum). Endnu er det meste af området åbent; men træerne er på vej, mest Alm. Røn (*Sorbus aucuparia*), Ahorn (*Acer pseudoplatanus*) og Dun-Birk (*Betula pubescens*), og det kan ikke vare mange år, før dette særprægede område er forvandlet til et uinteressant krat bestående af bl.a. ovennævnte træer samt Brombær.

### Skoven

Trævæksten består hovedsagelig af middelhøje Bøge (*Fagus sylvatica*), Ahorn, Ask (*Fraxinus excelsior*), Skov-Ælm (*Ulmus glabra*), Alm. Røn og Stilk-Eg (*Quercus robur*), medens urterne bl.a. er Stor Fladstjerne (*Stellaria holostea*), Hvid Anemone (*Anemone nemorosa*), Løgekarse (*Alliaria petiolata*), Alm. Vorterod (*Ficaria verna* ssp. *verna*), Feber-Nellikerod (*Geum urbanum*) og Alm. Hundegræs (*Dactylis glomerata*). En del af skovbunden og skrænten på østsiden er dækket af Vedbend (*Hedera helix*), og Alm. Gedeblad (*Lonicera periclymenum*) vokser op ad mange af træerne her.

Umiddelbart vest for dæmningen ligger en lille lund, der mest rummer Ask og Rødel (*Alnus glutinosa*). Ved et lille vandhul (øens eneste) i denne lund vokser bl.a. Sværtevæld (*Lycopus europaeus*), Vand-Mynte (*Mentha aquatica*), Angelik (*Angelica sylvestris*), Kærtidsel (*Cirsium palustre*), Bittersød Natskygge (*Solanum dulcamara*), Lyse-Siv (*Juncus effusus*), Lådden Dueurt (*Epilobium hirsutum*) og Mose-Bunke (*Deschampsia caespitosa*).



Tigger-Ranunkel (*Ranunculus sceleratus*)

er på Kalvø kun set i grøfter mellem moræneknolden og den nordlige del af øen.

### Strandeng og rørsump

Strandengen opnår som tidligere nævnt ingen nævneværdig størrelse. Ved øens nordøstside er den ca. 3 meter bred og rummer her bl.a. Strand-Annelgræs (*Puccinellia maritima*), Strand-Vejbred (*Plantago maritima*), Harril (*Juncus gerardi*), Krybende Hvene (*Agrostis stolonifera*) og Strand-Svingel (*Festuca arundinacea*). Noget længere sydpå på østkysten farver Strand-Asters (*Aster tripolium*) flere mindre områder blå. Udover de førnævnte strandengsarter findes her også Strand-Kogleaks (*Triglochin maritimum*) og Kær-Galtetand (*Stachys palustris*). Ved sydvestsiden er strandengen overvejende tør og domineres af Strand-Vejbred.

I det grøftede område syd for bygningerne findes engplanter som Kær-Trehage (*Triglochin palustre*), Vandnavle (*Hydrocotyle vulgaris*), Tigger-Ranunkel (*Ranunculus sceleratus*), Trævlekrone (*Lychnis flos-cuculi*) samt Glanskapslet Siv (*Juncus articulatus*) samt på kanten af og i grøfterne bl.a. Smalbladet Mærke (*Sium erectum*), Sump-Kællingetand (*Lotus uliginosus*), Smalbladet Dunhammer (*Typha angustifolia*) og den sjældne Samel (*Samolus valerandi*).

Ved sydsiden består vegetationen overvejende af Tagrør-sump (*Phragmites australis*), hvor de mest fremtrædende arter er Gærde-Snerle (*Calystegia sepium*), Kær-Svinemælk (*Sonchus palustris*), Kær-Galtetand, Angelik, Gul Iris (*Iris pseudacorus*) og Vejbred-Skeblad (*Alisma plantago-aquatica*).

#### Samel (*Samolus valerandi*)

vokser på Kalvø i bunden og på kanterne af et par af de grøfter, der findes i det lavtliggende område mellem moræneknolden og den bebyggede, nordlige del af øen.



### Floraliste for Kalvø

Så vidt vides har der ikke tidligere været foretaget systematiske og intense, botaniske undersøgelser på Kalvø. Naturhistorisk Forening for Jylland afholdt 3.-5. juni 1923 ekskursion til Aabenraa-egnen. I referatet fra denne ekskursion i Flora og Fauna (1923) nævnes 4 arter fra Kalvø. Disse er medtaget i min liste. Under et kort besøg i aug. 1991 fandt Alfred Hansen *Epilobium ciliatum*. Såfremt en art ikke er set på mine ekskursioner til øen den 15. april 1989, 21. aug. 1989, 16. juni 1990 (samt Jens Bjerring Poulsen) og den 21. maj 1991, er dette anført med et +. Fund af Brombær (*Rubus*), gjort af Anfred Pedersen i 1975, er mærket (AP).

Med hensyn til plantenavnene er så vidt muligt fulgt Dansk Feltflora (Hansen 1991, 5. opl.). Med hensyn til *Atriplex* (Mælde) er dog fulgt Pedersen (1968).

Ialt er der nu registreret 298 arter på Kalvø, heraf 8 *Rubus*-arter og 39, der tilhører slægten *Taraxacum* (Mælkebøtte).

### Alm. Rajgræs (*Lolium perenne*)

mangler sjældent på vore småøer, vel at mærke, når de er menneskepåvirkede i form af bl.a. beboelse og opdyrkning. På Kalvø findes den stort set kun i græsplæner ved rækkehusene (det gamle skibsværfts længer) og ved stien øen rundt.



- Acer pseudoplatanus (Ahorn)  
Achillea millefolium (Alm. Røllike)  
Aegopodium podagraria (Skvalderkål)  
Aethusa cynapium (Hundepersille)  
Agrimonia eupatoria (Alm. Agermåne)  
Agrostis gigantea (Stortoppet Hvene)  
 - stolonifera (Krybende Hvene)  
 - tenuis (Alm. Hvene)  
Alisma plantago-aquatica (Vejbred-Skeblad)  
Alliaria petiolata (Løgkarse)  
Allium oleraceum (Vild Løg)  
 - scorodoprasum (Skov-Løg)  
Alnus glutinosa (Rød-El)  
 - incana (Hvid-El)  
Alopecurus geniculatus (Knæbøjet Rævehale)  
Anchusa arvensis (Krumhals)  
Anemone nemorosa (Hvid Anemone)  
Angelica archangelica ssp. litoralis (Strand-Kvan)  
 - sylvestris (Angelik)  
Anthoxanthum odoratum (Vellugtende Gulaks)  
 + Anthriscus caucalis (Gærde-Kørvel) - 1923 (Nat. Forening for Jylland)  
 - sylvestris (Vild Kørvel)  
Aphanes arvensis (Alm. Dværøgløvefod)  
Arabidopsis thaliana (Gåsemad)  
Arctium minus (Liden Burre)  
Arenaria serpyllifolia (Alm. Markarve)  
Armeria maritima ssp. maritima (Engelskgræs)  
Armoracia rusticana (Peberrod)  
Arrhenatherum elatius (Alm. Draphavre)  
Artemisia vulgaris (Grå Bynke)  
Aster tripolium (Strand-Asters)  
Atriplex deltoidea (Tand-Mælde)  
 - latifolia s. str. (Spyd-Mælde)  
 - littoralis (Strand-Mælde)  
 - patula (Svine-Mælde)  
 - triangularis s. str. (Melet Mælde)  
Bellis perennis (Tusindfryd)  
Betula pubescens (Dun-Birk)  
 - verrucosa (Vorte-Birk)  
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus (Blød Hejre)  
Caltha palustris (Engkabbeléje)  
Calystegia sepium (Gærde-Snerle)

- Campanula rotundifolia (Liden Klokke)  
Capsella bursa-pastoris (Hyrdetaske)  
Cardamine hirsuta (Roset-Springklap)  
- pratensis ssp. pratensis (Engkarse)  
Carduus crispus (Kruset Tidsel)  
Carex acutiformis (Kær-Star)  
- arenaria (Sand-Star)  
- distans (Fjernakset Star)  
- nigra (Alm. Star)  
- otrubae (Sylt-Star)  
Centaurea jacea (Alm. Knopurt)  
Centaurium erythraea (Alm. Tusindgylden)  
Cerastium fontanum ssp. triviale (Alm. Hønsetarm)  
- semidecandrum (Femhannet Hønsetarm)  
Chaerophyllum temulentum (Hulsvøb)  
Chamaenerion angustifolium (Gederams)  
Chamomilla suaveolens (Skive-Kamille)  
Chenopodium album (Hvidmelet Gåsefod)  
Cirsium arvense (Ager-Tidsel)  
- oleraceum (Kål-Tidsel)  
- palustre (Kær-Tidsel)  
- vulgare (Horse-Tidsel)  
Cochlearia anglica (Engelsk Kokleare)  
Conyza canadensis (Canadisk Bakkestjerne)  
Crataegus laevigata (Alm. Hvidtjørn)  
- monogyna (Engriflet Hvidtjørn)  
Crepis capillaris (Grøn Høgeskæg)  
Dactylis glomerata (Alm. Hundegræs)  
Daucus carota ssp. carota (Vild Gulerod)  
Deschampsia caespitosa (Mose-Bunke)  
Dryopteris filix-mas (Alm. Mangeløv)  
Eleocharis palustris ssp. vulgaris (Alm. Sumpstrå)  
Elytrigia repens (Alm. Kvik)  
+ Epilobium ciliatum (Kirtlet Dueurt) - 1991 (AH)  
- hirsutum (Lådden Dueurt)  
- montanum (Glat Dueurt)  
Equisetum arvense (Ager-Padderok)  
- palustre (Kær-Padderok)  
Erigeron acre (Bitter Bakkestjerne)  
Erophila verna (Vår-Gæslingeblomst)

Eupatorium cannabinum (Hjortetrøst)  
Euphorbia helioscopia (Skærm-Vortemælk)  
 - peplus (Gaffel-Vortemælk)  
Fagus sylvatica (Bøg)  
Festuca arundinacea (Strand-Svingel)  
 - pratensis (Eng-Svingel)  
 - rubra ssp. rubra (Rød Svingel)  
Ficaria verna ssp. verna (Alm. Vorterod)  
Filago minima (Liden Museurt)  
Filipendula ulmaria (Alm. Mjødurt)  
Fragaria viridis (Bakke-Jordbær)  
Fraxinus excelsior (Ask)  
Gagea lutea (Alm. Guldstjerne)  
Galanthus nivalis (Vintergæk)  
Galeopsis bifida (Skov-Hanekro)  
Galium aparine (Burre-Snerre)  
 - mollugo (Hvid Snerre)  
 - palustre ssp. palustre (Kær-Snerre)  
Geranium molle (Blød Storkenæb)  
 - pusillum (Liden Storkenæb)  
 - pyrenaicum (Pyrenæisk Storkenæb)  
 - robertianum (Stinkende Storkenæb)  
Geum urbanum (Feber-Nellikerod)  
Glaux maritima (Sandkryb)  
Glechoma hederacea (Korsknap)  
Glyceria fluitans (Manna-Sødgræs)  
Hedera helix (Vedbend)  
Heracleum sibiricum (Grøn Bjørneklo)  
Hieracium aurantiacum (Pomerans-Høgeurt)  
 - pilosella (Håret Høgeurt)  
Holcus lanatus (Fløjlsgræs)  
Honckenya peploides (Strandarve)  
Hydrocotyle vulgaris (Vandnavle)  
Hypericum perforatum (Prikbladet Perikon)  
Hypochoeris radicata (Alm. Kongepen)  
Iris pseudacorus (Gul Iris)  
Juncus articulatus (Glanskapslet Siv)  
 - conglomeratus (Knop-Siv)  
 - effusus (Lyse-Siv)  
 - gerardi (Harril)  
 - ranarius (Klæg Siv)  
Knautia arvensis (Blåhat)  
Lamium album (Døvnælde)

- Lamium purpureum (Rød Tvetand)  
Lapsana communis (Haremad)  
Larix decidua (Europæisk Lærk)  
Lathyrus sylvestris (Skov-Fladbælg)  
Lemna minor (Liden Andemad)  
Leontodon autumnalis (Høst-Borst)  
Leucanthemum vulgare (Hvid Okseøjle)  
Leymus arenarius (Marehalm)  
Linaria vulgaris (Alm. Torskemund)  
Lolium perenne (Alm. Rajgræs)  
Lonicera periclymenum (Alm. Gedeblad)  
Lotus corniculatus (Alm. Kællingetand)  
- tenuis (Smalbladet Kællingetand)  
- uliginosus (Sump-Kællingetand)  
Luzula campestris (Mark-Frytle)  
Lychnis flos-cuculi (Trævlekrone)  
Lycopus europaeus (Sværttevæld)  
Lysimachia vulgaris (Alm. Fredløs)  
Majanthemum bifolia (Liljekonval)  
Malus x domestica (Sød-Æble)  
+ Malva pusilla (Liden Katost) - 1923 (Nat. Forening for Jylland)  
Medicago lupulina (Humle-Sneglebælg)  
Melilotus altissima (Høj Stenkløver)  
Mentha aquatica (Vand-Mynte)  
Moehringia trinervia (Skovarve)  
Muscari botryoides (Perlehyacint)  
Myosotis arvensis (Mark-Forglæmmigej)  
- discolor (Forskelligfarvet Forglæmmigej)  
- sylvatica (Skov-Forglæmmigej)  
Phleum pratense (Eng-Rottehale)  
Phragmites australis (Tagrør)  
Picea glauca (Hvidgran)  
Plantago lanceolata (Lancet-Vejbred)  
- major ssp. major (Glat Vejbred)  
- maritima (Strand-Vejbred)  
Poa annua (Enårig Rapgræs)  
- nemoralis (Lund-Rapgræs)  
- pratensis ssp. pratensis (Eng-Rapgræs)  
Polygonum amphibium (Vand-Pileurt)  
- aviculare ssp. aviculare (Alm. Vej-Pileurt)  
- convolvulus (Snerle-Pileurt)  
Populus canadensis cv. serotina (Landevejs-Poppel)  
- x candicans (Ontarisk Poppel)

- Potentilla anglica (Liggende Potentil)
- anserina (Gåse-Potentil)
  - argentea ssp. argentea (Sølv-Potentil)
- Prunella vulgaris (Alm. Brunelle)
- Puccinellia maritima (Strand-Annelgræs)
- cf. suecica (Slap Annelgræs)
- Pyrus communis (Pære)
- Quercus robur (Stilk-Eg)
- Ranunculus acris (Bidende Ranunkel)
- bulbosus (Knold-Ranunkel)
  - repens (Lav Ranunkel)
  - sceleratus (Tigger-Ranunkel)
- Reynoutria japonica (Japan-Pileurt)
- Ribes uva-crispa (Stikkelsbær)
- Rosa canina ssp. canina (Glat Hunde-Rose)
- dumalis ssp. dumalis (Blågrøn Rose)
  - rugosa (Rynket Rose)
- Rubus caesius (Korbær) - 1975 (AP)
- egregius (Brømbær, sect. Rubus)
  - idaeus (Hindbær)
  - insularis (Brømbær, sect. Rubus) - 1975 (AP)
  - pallidus (Brømbær, sect. Rubus) - 1975 (AP)
  - + - plicatus (Brømbær, sect. Rubus) - 1975 (AP)
  - polyanthemus (Brømbær, sect. Rubus) - 1975 (AP)
  - + - radula (Brømbær, sect. Rubus) - 1975 (AP)
  - sciocharis (Brømbær, sect. Rubus) - 1975 (AP)
  - vestitus (Brømbær, sect. Rubus) - 1975 (AP)
- Rumex acetosa (Alm. Syre)
- acetosella (Rødknæ)
  - crispus (Kruset Skræppe)
  - obtusifolius (Butbladet Skræppe)
  - sanguineus (Skov-Skræppe)
- Sagina procumbens (Alm. Firling)
- Salix caprea (Selje-Pil)
- repens (Krybende Pil)
- Sambucus nigra (Alm. Hyld)
- Samolus valerandi (Samel)
- Saxifraga granulata (Kornet Stenbræk)
- Scirpus maritimus (Strand-Kogleaks)
- tabernaemontani (Blågrøn Kogleaks)
- Sedum acre (Bidende Stenurt)
- Senecio jacobaea (Eng-Brandbæger)

- Senecio vernalis (Vår-Brandbæger)
- vulgaris (Alm. Brandbæger)
- Silene alba (Aften-Pragtstjerne)
- dioica (Dag-Pragtstjerne)
- Sium erectum (Smalbladet Mærke)
- Solanum dulcamara (Bittersød Natskygge)
- Sonchus arvensis (Ager-Svinemælk)
- oleraceus (Alm. Svinemælk)
  - palustris (Kær-Svinemælk)
- Sorbus aucuparia (Alm. Røn)
- Spergularia marina (Kødet Hindeknæ)
- media (Vingefrøet Hindeknæ)
- Stachys palustris (Kær-Galtetand)
- sylvatica (Skov-Galtetand)
- Stellaria alsine (Sump-Fladstjerne)
- graminea (Græsbladet Fladstjerne)
  - holostea (Stor Fladstjerne)
  - media (Alm. Fuglegræs)
- Symphoricarpos rivularis (Alm. Snebær)
- Syringa vulgaris (Syren)
- Tanacetum vulgare (Rejnfan)
- Taraxacum, sect. Erythrospermum (Rødfrugtet Sand-Mælkebøtte):
- Taraxacum fulvum
- Taraxacum, sect. Naevosa (Plettet Mælkebøtte):
- Taraxacum euryphyllum
- Taraxacum, sect. Celtica (Eng-Mælkebøtte):
- Taraxacum bracteatum
- duplidentifrons
  - gelertii
  - nordstedtii
- Taraxacum, sect. Hamata (Krogfliget Mælkebøtte):
- Taraxacum fusciflorum
- hamatiforme
- Taraxacum, sect. Ruderalia (Fandens Mælkebøtte):
- Taraxacum aequisectum
- ancistrolobum
  - angustisquameum
  - christiansenii
  - cordatum
  - corynodes
  - croceiflorum

Taraxacum cyanolepis

- dilaceratum
- diversilobum
- fasciatum
- haematicum
- hemicyclum
- laeticolor
- lingulatum
- lunare
- melanthoides
- mimulum
- ostenfeldii
- pallidipes
- pectinatiforme
- planum
- pseudoretroflexum
- purpureum
- scotiniforme
- sellandii
- subdahlstedtii
- subhuelpersianum
- trigonum
- uncosum
- xanthostigma

Thlaspi arvense (Alm. Pengeurt)Torilis japonica (Hvas Randfrø)Tragopogon pratensis (Eng-Gedeskæg)Trifolium arvense (Hare-Kløver)

- campestre (Gul Kløver)
- dubium (Fin Kløver)
- pratense (Rødkløver)
- repens (Hvidkløver)

Triglochin maritimum (Strand-Trehage)

- palustre (Kær-Trehage)

Tripleurospermum inodorum (Lugtløs Kamille)

- maritimum ssp. salinum (Alm. Strandkamille)

Tussilago farfara (Følfod)Typha angustifolia (Smalbladete Dunhammer)Ulmus glabra (Skov-Ælm)Urtica dioica (Stor Nælde)Vaccinium myrtillus (Blåbær)

Valeriana sambucifolia ssp. procurrens (Alm. Baldrian)

Valerianella locusta (Tandfri Vårsalat)

Veronica arvensis (Mark-Ærenpris)

- hederifolia ssp. hederifolia (Vedbend-Ærenpris)

Vicia angustifolia (Smalbladet Vikke)

- cracca (Muse-Vikke)

- hirsuta (Tofrøet Vikke)

- lathyroides (Vår-Vikke) - 1923 (Nat. Forening for Jylland)

Vinca minor (Liden Singrøn)

Viola arvensis (Ager-Stedmoderblomst)

- odorata (Marts-Viol)



Ager-Tidsel (Cirsium arvense)

findes hist og her på Kalvø, bl.a.  
i området omkring bebyggelsen mod  
nord samt på det højeste niveau  
ved det grøftede område nord for  
moræneknolden.

### Citeret litteratur

Dahl, K., 1976: Tekst og detailkort over fredede områder: 105. - København.

Hansen, K. (red.), 1991: Dansk Feltflora, 5. opl. - København.

Jerk, F., 1965: Trap Danmark, bd. X,1. - København.

Pedersen, A., 1968: Nogle kritiske, danske Atriplex-arter. - Bot.  
Tidsskr. 63: 289-303.

Pedersen, P. M., 1923: Naturhistorisk Forening for Jylland. Ekskursion  
til Aabenraa-egnen 3.-5. juni 1923. - Flora og Fauna: 82-83.

### Tak

Universitetslektor Alfred Hansen, rådgivende biolog Bernt Løjtnant og seminarielektor Anfred Pedersen takkes alle for deres kommentarer til manuskriptet. Alfred Hansen, Anfred Pedersen og lærer Hans Øllgaard takkes for hjælp i forbindelse med bestemmelse eller verifikation af en række planteindsamlinger.

Lærer Jens Chr. Schou takkes på det varmeste, fordi jeg måtte benytte hans tegninger i ø-floraen.

Erik Wessberg  
Sandagervej 13  
Assentoft  
8900 Randers

## HIDTIDIGE OG AKTUELLE Ø-UNDERSØGELSER


Hidtil er der i ø-floraserien udarbejdet floralister for følgende øer eller ø-grupper. (BL) er Bernt Løjtnant og (EW) Erik Wessberg.

1. Anholt (1981). - (BL & EW).
2. Hjarnø i Horsens Fjord (1981). - (BL & EW).
3. Treskelbakkeholm i Mariager Fjord (1983). - (BL & EW).
4. Klosterholm og Startøtterne i Nibe Bredning (1984). - (BL & EW).
5. Mellempolde i Randers Fjord ved Udbyhøj (1984). - (BL & EW).
6. Pletten (Store Plet) i Mariager Fjord (1984). - (BL & EW).
7. Alrø i Horsens Fjord (1985) - (EW).
8. Møgelø i Julsø syd for Silkeborg (1985). - (EW).
9. Lille Plet i Mariager Fjord nord for Pletten (1985). - (BL & EW).
10. Paradisøerne i Borre Sø syd for Silkeborg (1985). - (EW).
11. Alrø Poller i Horsens Fjord sydøst for Alrø (1985). - (EW).
12. Tange Ø i Tange Sø (1985). - (EW).
13. Hov Røn nordøst for Gyllingnæs (1986). - (BL & EW).
14. Svanegrunden nordøst for Endelave (1986). - (BL).
15. Vår Holm og Kyø Holm i Limfjorden ved Nibe (1986). - (EW).
16. Fjandø i Nisum Fjord (1986). - (EW).
17. Egholm i Limfjorden ved Ålborg (1986). - (BL & EW).
18. Søby Rev øst for Gyllingnæs (1986). - (BL & EW).
19. Agerø i Limfjorden sydvest for Mors (1987). - (EW).
20. Stenrevet i Randers Fjord vest for Udby (1987). - (EW).
21. Lundø mellem Skive Fjord og Lovns Bredning (1987). - (EW).
22. Stenklipperne i Limfjorden ved Agerø (1987). - (EW).
23. Odbold i Randers Fjord nord for Stenrevet (1988). - (BL & EW).
24. Livø i Limfjorden (1988). - (BL & EW).
25. Svinø i Gamborg Fjord sydøst for Middelfart (1989). - (EW).
26. Lilleø, Bregneø og Alø i Julsø syd for Silkeborg (1989). - (EW).
27. Store og Lille Rotholm i Risgårde Bredning nord for Hvalpsund (1989). - (EW).
28. Sankt Thomas i Skanderborg Sø (1990). - (EW).
29. Æbelø i Skanderborg Sø (1990). - (EW).
30. Kalvø i Skanderborg Sø (1990). - (BL & EW).
31. Mågeøerne ved Bogense (1991). - (BL & EW).
32. Tunø ved Samsø (1991). - (BL & EW).
33. Hornsgård Holm og Tøtten i Limfjorden nordvest for Nibe (1991). - (EW).
34. Torø i Lille Bælt syd for Assens (1991). - (EW).
35. Lindholm i Limfjorden øst for Thyholm (1991). - (BL & EW).
36. Kalvø i Genner Bugt (1991). - (EW).

Siden 1981 er der endvidere foretaget floristiske undersøgelser - med henblik på udarbejdelse af floralister med noter - på følgende øer eller ø-grupper - regnet fra nord:

Rønnerne mellem Frederikshavn og Strandby.  
 Hornfiskrøn syd for Læsø.  
 Gjøl ved Limfjorden nordvest for Ålborg.  
 Øland ved Limfjorden vest for Gjøl.  
 Arup Holm i Limfjorden ved Feggesund.  
 Friggøerne ved Løgstør.

Fur i Limfjorden.  
 Fuglholm i Limfjorden mellem Jegindø og Agerø.  
 Rønland øst for Harboør Tange.  
 Jegindø i Limfjorden øst for Thyholm.  
 Venø i Limfjorden sydøst for Thyholm.  
 Piggen i Randers Fjord nord for Uggehuse.  
 Kalø i Kalø Vig.  
 Hindø i Stadil Fjord.  
 Sejerø sydvest for Sjællands Odde.  
 Lindholm nordøst for Stavns Fjord ved Samsø.  
 Kyholm vest for Lindholm.  
 Kolderne i Stavns Fjord ved Samsø.  
 Ægholm i Stavns Fjord ved Samsø.  
 Sværm i Stavns Fjord ved Samsø.  
 Mejlesholm i Stavns Fjord ved Samsø.  
 Hjortholm i Stavns Fjord ved Samsø.  
 Eskeholm i Stavns Fjord ved Samsø.  
 Brokold i Stavns Fjord ved Samsø.  
 Vorsø i Horsens Fjord.  
 Vorsø Kalv i Horsens Fjord sydvest for Vorsø.  
 Orø i Isefjorden.  
 Nekselø i Nekselø Bugt.  
 Endelave sydvest for Samsø.  
 Dræet syd for Æbelø ved Bogense.  
 Ejlinge sydøst for Æbelø ved Bogense.  
 Drættegrund sydvest for Æbelø ved Bogense.  
 Mejlø ved Hindsholm.  
 Bogø ved Hindsholm.  
 Vejlø ved Hindsholm.  
 Vejlø Kalv ved Hindsholm.  
 Ølsemagle Revle i Køge Bugt.  
 Holmene ved Drejet i Odense Fjord.  
 Ægholm ved Hofmansgave i Odense Fjord.  
 Trindelen ved Hofmansgave i Odense Fjord.  
 Learmer ved Hofmansgave i Odense Fjord.  
 Kyholm syd for Learmer i Odense Fjord.  
 Tornø i Odense Fjord.  
 Romsø i Store Bælt.  
 Båge i Lille Bælt nordvest for Assens.  
 Årø i Lille Bælt nordvest for Assens.  
 Agersø i Store Bælt sydvest for Skælskør.  
 Glænø i Holsteinborg Nor sydøst for Skælskør.  
 Ormø i Holsteinborg Nor øst for Glænø.  
 Helnæs nordvest for Fåborg.  
 Vigø i Helnæs Bugt nordvest for Fåborg.  
 Horsehoved i Helnæs Bugt nordvest for Fåborg.  
 Illumø i Helnæs Bugt nordvest for Fåborg.  
 Barsø i Lille Bælt nordvest for Als.  
 Bjørnø syd for Fåborg.  
 Masnedø ved Vordingborg.  
 Siø mellem Tåsinge og Langeland.  
 Lilleø i Smålandsfarvandet nord for Askø.  
 Askø i Smålandsfarvandet nord for Bandholm.  
 Langø i Lindelse Nor syd for Rudkøbing.  
 Christiansø ved Bornholm.  
 Frederiksoø ved Bornholm.



● : øer, for hvilke BL & EW har udarbejdet floralister med noter.

○ : øer, på hvilke BL & EW siden 1981 har foretaget floristiske undersøgelser med henblik på udarbejdelse af totalfloralister med noter om bl.a. særlige floristiske forhold, aktuelle trusler samt plejebehov.

Iøvrigt henvises til afsnittet om vore hidtidige og aktuelle ø-undersøgelser.