


SIØ


melle
Tåsinge og Langeland




Ø-flora nr. 53

af
Erik Wessberg

Randers 1993



Kortet her stammer fra Daniel Bruun's bilag til "Danmark – Land og Folk" (1922). I forbindelse med udarbejdelsen af ø-flora nr. 52, Øland ved Ålborg (Wessberg 1993), oplystes det, at kortet ikke kunne dateres nøjagtigt, men at det på grund af landskabsændringer ved bl.a. Nordfyns kyst måtte være tegnet efter 1870 og før 1921. På Bruun's kort anvendes det ældre navn, Sidö, som er brugt så sent som i Hvem–Hvad–Hvor, Årbog 1946. Kortet er i 1:200.000.



Kort- og Matrikelstyrelsens 4-cm kort er udtegnet efter flygefotografering i 1973, og der er foretaget rettelser i 1983. Det må formodes, at det er det nyeste, der findes. Både forbindelsen til Tåsingør i 1960 i form af dæmning og bro og forbindelsen til Langeland i 1962 i form af bro, er naturligvis indtegnete. I området omkring de to vindmøller sydøst for Siøgård, mærket med det specielle tegn for vindmøller, har de tidligere øer, Store og Lille Fuglø, ligget. Kortet er 1:25.000.

Siø mellem Tåsinge og Langeland – en ø-floraliste med noter

Indledning

Siø har et areal på ca. 133 hektar og ligger midt i det smalle sund mellem Tåsinge og Langeland med en afstand på ca. 2 km til de to øer. Den vestlige del bærer navnet Skovø, og den har da også for relativt få år siden været en skovklædt, selvstændig ø.


Indtil for ganske få år siden, efter brobygningen i 1960'erne, har der ved sydkysten, sydøst for Siøgård, ligget to små holme med navnene Store og Lille Fugleø. Da Achtion Friis i 1921 besøgte Siø, omtalte han disse, der da var hhv. 4,6 og 0,2 tdr. land store. Holmene indgår nu efter digebygning og afvanding i det opdyrkede areal, jf. kortene side 2. At digebygningen er foregået inden for de sidste ca. 10 år, understreges af, at såvel Palle Gravesen i Fynsbindet i "Oversigt over Botaniske Lokaliteter" (1979) som Erik Aalbæk Jensen i "Livet på Øerne – Langelændere og folk fra Svendborgsund", 1982, omtaler de to øer.

Siø er meget flad. På nyeste geodætiske kort fra 1973 med rettelser i 1983 er der på den tidligere Skovø et mindre område, der ligger ca. 3 m.o.h., og både her og nær Siøgård findes to små områder, der "stikker" ca. 2 meter op. Resten, dvs. langt over 90% af arealet, ligger under kote 1. Af den årsag er hele øen, på nær en mindre strækning ved de tidligere arbejderboliger ved Langelandsbroen, da også omgivet af lave diger.

Så at sige hele øen er i dag opdyrt. At den del, der stadig bærer navnet Skovø, tidligere har været delvist skovdækket, anfører F.C. Lund i bogen "Øen Thorseng" (1823), og da bl.a. Siø og Skovø for over 250 år siden blev opmålt, knyttedes dertil kommentarerne, citeret ordret ... "Den østre er idel Græsmark, derpaa en Koforpagter i et Hus; den vestre Del er Græs og Skov paa og 1 Hus paa".... (Sørensen 1703). Ordene er citeret fra Friis, da det ikke har været muligt at få fat i originalkilden. Da Achtion Friis i 1921 sammen med tegneren og maleren Johannes Larsen besøgte Siø, skrev han i sin dagbog de ord, som stadig er gældende ..."Øens kedsommelige, dyrkede flade"..., men han skriver desuden, at.."For indtil en god Menneskealder siden var Øen fuldstændig udyrket og lå hen i Tuer og Smårevl".... Det kan derfor ses ud til, at øen på et eller andet tidspunkt efter at Sørensen i 1703 havde besøgt den, er blevet opgivet.

Sylt Star (*Carex otrubae*)

er den ene af de kun to Star-arter, der er fundet på Siø. Jeg har fundet den flere steder i grøfterne på øen, især i de grøfter, der løber parallelt med hovedvej A-9. Den anden Star-art er Kær-Star (*C. acutiformis*), som til gengæld kun er set ét sted. Det er en af de "nye" arter, jeg fandt, da tre af vandhullerne på den store, opdyrkede mark øst for Siøgård i eftersommeren 1993 efter afsluttet høst endelig kunne besøges. Af andre arter, der kun er fundet i dette vandhul, er Smalbladet Dunhammer (*Typha angustifolia*), Bånd-Pil (*Salix viminalis*) og Liden Andemad (*Lemna minor*).



M.J. Darre nævner i Daniel Bruun's 5 binds værk "Danmark – Land og Folk", at i 1920 var 178 tdr. land af Siø's 240 tdr. land ager, 40 tdr. var eng og vedvarende græsningsjord, medens 34 tdr. var "andre Arealer". Der nævnes i værket ikke noget om befolkningstallet. Det gør der derimod i Hvem–Hvad–Hvor, 1946, som informerer om, at der på "Skovø–Sidø" i 1940 var 32 indbyggere. I dag er der vel omkring 10.

I 1960 blev Siø landfast med Tåsinge. Dette år indviedes nemlig vejdæmningen og broen fra området umiddelbart syd for Tvedeskov på Tåsinge og til Skovø på Siø, og i 1962 indviedes Langelandsbroen, som er Danmarks første søjlebro. Siø's status som ø blev derved ændret.

Det siger sig selv, at det er småt med "rigtig" natur på Siø. De ord, Achton Friis nedfældede efter sit besøg for godt 70 år siden, er stadig gældende. Der er dog trods alt lyspunkter. Langs det meste af kysten findes strandoverdrev og/eller strandeng, nogle få steder rørsump. Desuden er der en mindre plantning ved nordsiden, nogle små vandhuller, især på de opdyrkede marker, et par afvandingsgrøfter, et vandlidende område, hvor Store og Lille Fugleø engang lå og de lange diger; men alle nævnte områder er arealmæssigt beskedne. Det er dog primært her og i vejkantene, vejrabatterne, grøfterne og på grøftekanterne langs den meget trafikerede hovedlandevej A-9, at de fleste af de 284 plantearter er fundet.

Med undtagelse af vandhuller og vejkantter begyndes omtalen af vegetationstyperne ved Tåsingedæmningens nordside, og i urets retning beskrives lokaliteterne, som alle er kystnære.

I teksten vedrørende omtalen af vegetationen er de benyttede plantenavne første gang, de bliver nævnt, med både dansk og latinsk navn, derefter kun med dansk.

Vegetationen på Siø


Vandhuller

Rundt omkring på Siø ligger ca. 10 små vandhuller, alle med et areal under 500 m². Kun tre af disse er undersøgt, idet de øvrige på grund af de omliggende, opdyrkede marker ikke har kunnet undersøges. De tre undersøgte har af samme grund kun kunnet besøges én gang.

Vandhullet mærket 1 er omgivet af et meget tæt krat af Bånd–Pil (*Salix viminalis*) og en del plantet Rynket Rose (*Rosa rugosa*). Vandhullet, hvis overflade er dækket af Liden Andemad (*Lemna minor*) har et sumpet/dyndet centrum, hvor Smalbladet Dunhammer (*Typha angustifolia*) er

Gærde–Kartebolle (*Dipsacus fullonum*).

Nær 14 km–stenen, ca. ½ km nordvest for Siøgård, findes en relativt smal afvandingskanal. På siderne samt på den øverste, flade del vokser Gærde–Kartebolle. Alfred Hansen anfører i afhandlingen i TBU vedrørende bl.a. Dipsacaceae i Danmark, at den mest vokser enkeltvis eller i ganske få eksemplarer. Sådan er jeg også vant til at se den; men på Siø findes der ved ovennævnte kanal talrige eksemplarer, vel flere hundrede. Derudover findes den bl.a. på diget nær Langelandsbroen. Iøvrigt regnes Gærde–Kartebolle i Danmark kun som nogenlunde hyppig på Lolland.



den dominerende art. Også af Kær-Star (*Carex acutiformis*) er der meget. Den er iøvrigt i den del af landet, bl.a. på Tåsing og Langeland, sjælden, jf. Wiinstedt 1943. De øvrige arter med direkte tilknytning til vandhullet er Lådden Dueurt (*Epilobium hirsutum*), Stor Nælde (*Urtica dioica*), Sværtevæld (*Lycopus europaeus*), Tigger-Ranunkel (*Ranunculus sceleratus*), og kystens nærhed afspejles i forekomsten af Strand-Kogleaks (*Scirpus maritimus*). I et smalt, uopdyrket område omkring pilekrattet findes Alm. Kvick (*Elytrigia repens*), Vild Kørvel (*Anthriscus sylvestris*), Horse-Tidsel (*Cirsium vulgare*), Prik-bladet Perikon (*Hypericum perforatum*) og Glat Dueurt (*Epilobium montanum*). Ved besøget den 4. aug. 1993 var to lokale jægere ved at slå det tætte plantedække omkring vandhullet, øjensynligt for at have bedre udsyn til de andefugle, som eventuelt kunne tænkes at søge hertil. I det uopdyrkede område var der en del Krus-Persille (*Petroselinum crispum* var. *crispum*). Netop på Siø er der i de år, jeg har besøgt den, blevet dyrket krydderurter, bl.a. Krus-Persille og Dild (*Anethum graveolens*).

Vandhul nr. 2 er kystnært og ligger nordøst for nr. 1. Allerinderst er der en lille, fri vandoverflade uden vegetation. Det er meget vanskeligt at trænge derind på grund af meget højt og tæt Tagrør (*Phragmites australis*). Kun i zonen, der slutter sig til den opdyrkede mark (1993 Raps), findes Ru Svinemælk (*Sonchus asper*) og Ager-Svinemælk (*S. arvensis*). Efter høsten sås overalt i marken store mængder af meget lave Stivhåret Ranunkel (*Ranunculus sardous*).

Det sidste vandhul, der har kunnet undersøges, (nr.3), er ligesom det første omgivet af pilekrat, her af Lådden Pil (*Salix x dasyclados*) og Lancet-Pil (*S. x smithiana*). Der var på undersøgelsestidspunktet intet vand, men den centrale del var meget sumpet. De eneste arter, der er set her, er Stor Nælde, Muse-Vikke (*Vicia cracca*), Lådden Dueurt og, besynderligt nok, Alm. Katost (*Malva sylvestris*).


Vejkanter, vejrabatter og grøftekanter

Fra Svendborg og til Langeland er der i begge vejsider anlagt cykelstier, der afgiver fra de mange andre, danske cykelstier ved, at der mellem den og vejbanen er en ca. 1 meter bred vejrabat.

Ved vigen ved 9-tallet på kortet og mellem 13 og 14 km-stenen vokser Cikorie (*Cichorium intybus*), som er meget almindelig på Siø, Grå Bynke (*Artemisia vulgaris*), Rejnfan (*Tanacetum vulgare*), Vild Kørvel, Kruset Skræppe (*Rumex crispus*), Alm. Røllike (*Achillea millefolium*), Stor Nælde og Følfod (*Tussilago farfara*). Af græsser kan nævnes Alm. Hvene (*Agrostis tenuis*), Rød Svingel (*Festuca rubra* ssp. *rubra*), Alm. Hundegræs (*Dactylis glomerata*), Alm. Rajgræs (*Lolium perenne*) og Draphavre (*Arrhenatherum elatius*). Persille, som har været dyrket på øen igennem en årrække, vokser som forvildet ved den trafikerede hovedvej.

Kær-Svinemælk (*Sonchus palustris*)

Denne flere meter høje urt er ikke tidligere registreret på Siø. Den er kun set ét sted på øen, nemlig i et ganske lille rørsump-område på indersiden af dæmningen ved somærkerne nær Langelandsbroen ved Siø's sydøstlige side.



Længere mod Tåsinge ses bl.a. Krybende Potentil (*Potentilla reptans*), Humle-Sneglebælg (*Medicago lupulina*), Lucerne (*M. sativa*), Alm. Knopurt (*Centaurea jacea*), Eng-Gedeskæg (*Tragopogon pratensis* ssp. *pratensis*), Skvalderkål (*Aegopodium podagraria*), Hvid Okseøje (*Leucanthemum vulgare*) samt Blød Hejre (*Bromus hordeaceus* ssp. *hordeaceus*), Alm. Rapgræs (*Poa trivialis*), Prikbladet Perikon, Alm. Katost og Vår-Brandbæger (*Senecio vernalis*). Nær dæmningen vokser på grøftekanten bl.a. Alm. Vorterod (*Ficaria verna* ssp. *verna*), Korsknap (*Glechoma hederacea*), Skov-Løg (*Allium scorodoprasum*), Ager-Padderok (*Equisetum arvense*), Opret Hønsetarm (*Cerastium glomeratum*), Vår-Gæslingebłomst (*Erophila verna*) og Tandfri Vårsalat (*Valerianella locusta*).

I den modsatte retning, mod Langeland, vokser udo over flere af de nævnte arter bl.a. Aften-Pragtstjerne (*Silene alba*), Hvid Snerre (*Galium mollugo*), Hvas Randfrø (*Torilis japonica*) og Stivhåret Ranunkel. Over for Siøgård er vejkanten præget af mange Cikorie.

Rundturen nordenom langs kysten

Ved begyndelsen af Tåsinge-dæmningen, på Skovø's nordside, findes der en ganske lille, fugtig lavning med et par af de arter, der ofte findes på lignende lokaliteter. Det drejer sig om Tudse-Siv (*Juncus būfoni*), Fløjlsgræs (*Holcus lanatus*), Knudet Pileurt (*Polygonum lapathifolium* ssp. *lapathifolium*) og Fersken-Pileurt (*P. persicaria*).

I hegnet, der i få meters afstand fra vandlinien strækker sig langs kysten, findes flere steder bevoksninger af Brombær-arten *Rubus radula*. Iøvrigt består hegnet, der de fleste steder er meget tæt og uigen-nemtrængeligt, mest af buske og træer af Ask (*Fraxinus excelsior*), Alm. Hyld (*Sambucus nigra*), Rynket Rose, Slåen (*Prunus spinosa*) og en Elme-art, sandsynligvis en krydsning (*Ulmus*).

Den første strækning på ca. 200 meter rummer strandrørsump på op til 5 meters bredde, bestående af Tagrør iblandet masser af Ager-Svinemælk og en del Gærde-Snerle (*Calystegia sepium*). Andre arter er bl.a. Fladstrået Siv (*Juncus compressus*) og Kær-Galtetand (*Stachys palustris*). På blottede steder på den stenede strand vokser Strand-Bede (*Beta vulgaris* ssp. *maritima*) og Strandarve (*Honckenya peploides*).

Smalbladet Kællingetand (*Lotus tenuis*).

44 arter, som er set af Anfred Pedersen i 1963 og under Botanisk Forenings ekskursion i 1972, har jeg ikke kunnet finde. For nogles vedkommende er forklaringen simpel, for andre gådefuld. At f.eks. Morgenfrue (*Calendula officinalis*) og Kron-Okseøje (*Chrysanthemum coronarium*) ikke er genfundet, er nærmest indlysende. At arter som Stilket Kilebæger (*Halimione pedunculata*), Smalbladet Kællingetand (*Lotus tenuis*) og Spidshale (*Parapholis strigosa*) heller ikke har kunnet genfindes, er der en mulig forklaring til, idet det største, tidligere strandengsområde ved Store og Lille Fuglø nu er inddiget og opdyrket. Men at ganske almindelige arter som bl.a. Strand-Svingel (*Festuca arundinacea*), Spergel (*Spergula arvensis*), Alm. Engelskgræs (*Armeria maritima* ssp. *elongata*), Gul Fladbælg (*Lathyrus pratensis*), Mark-Krageklo (*Ononis repens*) og Linden Storkenæb (*Geranium pusillum*) ikke er set af mig under mine 5 ture til Siø, er uforskrligt. De optræder ikke i mine notesbøger.



Mange steder på nordsiden er der kystsikring i form af store brøndringe. Deres noget forvitrede tilstand og den ret sjuskede måde, hvorpå de står, vidner om, at det efterhånden er mange år siden, de er blevet anbragt dér. Det er noget af et forhindringsløb at forcere de mange rækker kystsikningsrør. Ved lækysten findes flere steder småle rørsumpzonener og smalle, oftest stenede strandoverdrevszoner. Vegetationen består hyppigt af Strand-Karse (*Lepidium latifolium*), som ofte danner store bevoksninger. Derudover optræder arter som Alm. Røllike, Kruset Skræppe, Alm. Torskemund (*Linaria vulgaris*), Dansk Kokleare (*Cochlearia danica*), Strand-Malurt (*Artemisia maritima*) og Strandarve.

I og ved en lille, isoleret strandsump viser vegetationen, at området aldrig overskyldes. Her vokser bl.a. Sværtevæld, Glat Dueurt, Kær-Dueurt (*Epilobium palustre*), Dunet Dueurt (*E. parviflorum*) og Rank Dueurt (*E. lamyi*), Bittersød Natskygge (*Solanum dulcamara*), Muse-Vikke og Gåse-Potentil (*Potentilla anserina*).


I det kystnære hegnet ved nordkysten er Sølv-Poppel (*Populus alba*) hyppigste træart. Nord og nordvest for Siøgård ligger en mindre plantning med især Sitka-Gran (*Picea sitchensis*) og Rødgran (*P. abies*). Af andre træer er set Navr (*Acer campestre*), Stilk-Eg (*Quercus robur*), Dun-Birk (*Betula pubescens*), Alm. Hyld og Selje-Røn (*Sorbus intermedia*), af hvilke Dun-Birk og Alm. Hyld skønnes "selvsåede". Af urter skal først og fremmest nævnes den store mængde af Vild Kørvel og Stor Nælde, som begge er så tætvoksende, at de "overskygger" den øvrige vegetation så meget, at andre planter vantrives. Omgivet af tæt bevoksning ligger her et lille vandhul uden egentlig vandvegetation. Hvor der er lidt lys, vokser i vandhullet umiddelbare nærhed Haremåd (*Lapsana communis*), Sværtevæld, Tveskægget Årenpris (*Veronica chamaedrys*), Lådden Dueurt, Hulsvøb (*Chaerophyllum temulentum*) og Skov-Burre (*Arctium nemorosum* ssp. *nemorosum*) samt lidt Korbær (*Rubus caesius*).

Området fra sømærket ved Siø Hage og til Barnesten ved den gamle skibsbro er generelt et "trist" botanisk område. Undtaget herfra er dog de lave kystsentræer, som flere steder rummer Hulkavet Koderiver (*Primula veris*), alle steder dog i et mindre antal.

I det meget smalle område mellem det levende hegnet og kysten, hvor den stenede strand flere steder nu er afløst af sandet strand, dominerer mange steder Tagrør. I kæmpe opskylszoner af Ålegræs (*Zostera* sp.) ses bl.a. Strand-Mælde (*Atriplex littoralis*), Skov-Hanekro (*Galeopsis bifida*) og Vand-Pileurt (*Polygonum amphibium*), og på blottede steder Strand-Kvik (*Elytrigia juncea* forma). Strand-Vejbred (*Plantago maritima*) er – på grund af mangel på egnede voksesteder – her fundet i kun ét eksemplar. På strandoverdrevet, som ved Barnesten er betydeligt bredere end de fleste andre steder på Siø, vokser bl.a. Rejnfan, Kruset Skræppe, Alm. Katost

Rød Svingel (*Festuca rubra* ssp. *rubra*)

5 græsser er meget almindelige på Siø. Udenfor Rød Svingel drejer det sig om Draphavre (*Arrhenatherum elatius*), Alm. Hvene (*Agrostis tenuis*), Alm. Hundegræs (*Dactylis glomerata*) og Alm. Kvik (*Elytrigia repens*). Det er dog først og fremmest langs A-9 samt på digerne, de vokser. Derudover findes bl.a. en hel del Gold Hejre (*Bromus sterilis*), primært i markskel og i de hegner, der støder op til markerne. I strandengsområderne, omend de alle er af begrænset størrelse, vokser "naturligvis" Strand-Annelgræs (*Puccinellia maritima*) og i strandrørsumpene Tagrør (*Phragmites australis*). Glemmes skal ikke de utallige eksemplarer af Stor Væselhale (*Vulpia myuros*) i og ved en mark ved Langelandsbroen.




og Rynket Rose. I strandengszonen, specielt på den sydlige side af landingsbroen, findes ordinære strandengsarter som Strand-Mælde, Strand-Asters (*Aster tripolium*), Strandgåsefod (*Suaeda maritima*), Strand-Kogleaks og de to Mælde-arter, Tand-Mælde (*Atriplex deltoidea*) og Spyd-Mælde (*A. latifolia* s. lat.). Strandoverdrevet fungerer for en dels vedkommende ikke helt uventet som såvel afbrændingsplads som deponeringsområde for haveaffald, herunder overskuddet af den store høst af frugt i 1993.

På den sydlige side af "opkørslen" til Langelandsbroen fandtes i 1992 i det smalle, opdyrkede areal mellem vejskrænten og kysten store mængder af Stor Væselhale (*Vulpia myuros*), som voksende i flere, adskilte bestande. I samme område vokser en anden, på disse kanter helt almindelig græsart, nemlig Gold Hejre (*Bromus sterilis*), som findes på mange af de fynske øer, hvis vegetation er blevet eller er i færd med at blive undersøgt i forbindelse med ø-floraserien. På den store vejskrænt findes Siø's eneste bestand af Gederams (*Chamaenerion angustifolium*), som her er talrig, ligesom også Rejnfan er det. Af andre arter på vejskrænten eller i kanten af den nærliggende mark kan nævnes krydsningen mellem Alm. Stedmoderblomst og Ager-Stedmoderblomst (*Viola tricolor x arvensis*), Fløjlsgræs, Gåsemad (*Arabidopsis thaliana*), Femhannet Hønsetarm (*Cerastium semidecandrum*) og Roset-Springklap (*Cardamine hirsuta*).

I et meget lille, kystnært vådområde ved sømærkerne ved sydsiden af "opkørslen" til Langelandsbroen vokser Kær-Svinemælk (*Sonchus palustris*). Her er stranden meget smal, og som kystsikring er der anbragt mange, store sten. Diget, der strækker sig langs hele sydkysten, er her ca. 1½ meter høj og har flere steder tætte bevoksninger af *Rubus vestitus*, ligesom den på størstedelen af strækningen til Barhoved på Skovø har et plantet hegn af samme Elme-krydsning, som fandtes ved nordsiden. Derudover findes på eller ganske nær diget Stikkelsbær (*Ribes uva-crispa*), Gærde-Kartebolle (*Dipsacus fullonum*), Skov-Galtetand (*Stachys sylvatica*), Butbladet Skrappe (*Rumex obtusifolius*), Sildig Gyldenris (*Solidago canadensis*), Rød Tandbæger (*Ballota nigra* ssp. *nigra*), Tidselkugle (*Echinops exaltatus*) og Krybende Potentil samt nogle plantede buske af Kobber-Rose (*Rosa rubrifolia*). Med undtagelse af Krybende Potentil er der tale om arter, der normalt ikke forentes i et sådant område. Det kan derfor tyde på, at der på et eller andet tidspunkt har været deponeret haveaffald herude.


Smalbladet Dunhammer (*Typha angustifolia*)

vokser i forholdsmaessig stor mængde i vandhul nr. 1. Alle vandhuller ligger, med undtagelse af ét, på Siøgård's udstrakte marker, og det er på reglementeret vis kun muligt at komme til dem umiddelbart efter høst. Udo over Smalbladet Dunhammer er der i vandhul nr. 1 kun få, andre arter. Det drejer sig om Sværtevæld (*Lycopus europaeus*), Tigger-Ranunkel (*Ranunculus sceleratus*), Liden Andemad (*Lemna minor*), Kær-Star (*Carex acutiformis*) og Strand-Kogleaks (*Scirpus maritimus*). Tagrør (*Phragmites australis*), som stort set er enerådende i vandhul nr. 2, findes af en eller anden grund ikke her.



Meget af området ved de to store vindmøller syd for Siøgård (se kortet side 2) er tidligere havbund. En mindre del af arealet er dog de to tidligere øer Store og Lille Fugleø. I en afvandingsgrøft ved sydsiden vokser bl.a. Strand-Karse, Strand-Trehage (*Triglochin maritimum*), Strand-Annelgræs (*Puccinellia maritima*) og Strand-Asters. Et lavliggende område omkring vindmøllerne er endnu for vådt til at kunne opdyrktes. I 1992 fandtes her Knæbøjet Rævehale (*Alopecurus geniculatus*), Blågrøn Gåsefod (*Chenopodium glaucum*), Sandkryb (*Glaux maritima*), Stivhåret Ranunkel, Alm. Salturt (*Salicornia europaea*) og Krybende Hvene. I det noget tørreste, men endnu uopdyrkede område omkring vådområdet og møllerne, vokser Løgkarse (*Alliaria petiolata*), Stor Nælde og masser af Skive-Kamille (*Chamomilla suaveolens*).

Der er så godt som ingen strand her ved sydkysten vest og sydvest for møllerne. Diget er ca. 4 meter bredt, og der er kørt og bliver stadig kørt bygningsaffald derpå. Det ser forresten "herrens" ud, og det ses på vegetationen, at der mest er tale om "unaturlige" arter, idet floraen bl.a. (1992) tæller arter som Kruset Tidsel (*Carduus crispus*), Peberrod (*Armoracia rusticana*), Dild (*Anethum graveolens*), Snerle-Pileurt (*Polygonum convolvulus*), Rank Vejsennep (*Sisymbrium officinale*) og Gærde Valmue (*Papaver dubium*).



Vand-Pileurt (*Polygonum amphibium*).

Flere steder på Siø findes Vand-Pileurt som ukrudt i den mest fugtige del af markerne. Desuden vokser den på den sandede strand mod nordøst mellem sømærket og Barnesten. I dette område, der flere steder domineres af Tagrør (*Phragmites australis*), findes også Strandarve (*Honckenya peploides*), Skov-Hanekro (*Galeopsis bifida*) og Strand-Kvik (*Elytrigia junceiforme*).


Over for Siøgård er stranden smal og stenet med bl.a. Tagrør, Harril (*Juncus gerardi*), Strand-Mælde, Strand-Asters og Vingefrøet Hindeknæ (*Spergularia media*).

Nær 14 km-stenen ca. ½ km vest for Siøgård findes der en afvandingskanal uden andre arter end Strand-Kogleaks. På de skrå sider ned mod kanalen vokser store mængder af Gærde-Kartebolle (jf. figurteksten side 4).

Ved Tåsinge-dæmningen findes på den sydlige side et ca. 1000 m² stort område med strandrørsump, domineret af Tagrør og Strand-Karse. Strandens er stenet og med arter som f.eks. Alm. Torskemund, Strand-Kvik, Strand-Malurt, Marehalm (*Leymus arenarius*) Ager-Svinemælk, Strand-Mælde og Engelsk Kokleare (*Cochlearia anglica*). Nogle af disse arter findes også i den inderste del af rørsumpen. I den mark, der støder op til det lave dige, findes et sandt hav af Korn-Valmue (*Papaver rhoeas*), og der er også konstateret Flyve-Havre (*Avena fatua*). Ved besøget den 25. juni 1992 sås en landmand bruge det meste af dagen på at trave marken tynd med den berømte sæk til indsamling af det berygtede ukrudt.

På diget mellem sømærket og Barhoved i sydvest vokser Ager-Snerle (*Convolvulus arvensis*), Drap-havre, som er den dominerende art, Burre-Snerle (*Galium aparine*), Gul Snerle (*G. verum* ssp. *verum*) og Rejnfan. Den eneste trævækst er et par eksemplarer af Alm. Hyld. Ved digeknækket findes megen Skarntyde (*Conium maculatum*), Bittersød Natskygge og Gold Hejre. Øens marksten bliver aflæsset her som et ekstra skjold mod havets nedbrydende kræfter.

Stranden bliver mellem Barhoved og sømærket på Skovø bredere og opnår en største bredde på ca. 3 meter, og den er over en strækning på ca. 50 meter fuldstændig domineret af Strand-Malurt. Her er fundet øens eneste bestand af Lav Hinddebæger (*Limonium humile*), jf. figurtekst side 16. I hegnet ved diget eller på selve diget vokser af buske og træer bl.a. Sølv-Poppel, Alm. Hvidtjørn (*Crataegus laevigata*), Ask (*Fraxinus excelsior*), Slåen, Korbær og Rynket Rose og af urter bl.a. Horse-Tidsel, Skov-Hanekro og Vild Kørvel med sidstnævnte som den absolut dominerende. På diget findes iøvrigt en Sølvmåge-koloni samt adskillige svanereder.



Strand-Kogleaks (*Scirpus maritimus*)

vokser mange steder ved kysten, i vandhuller og i grøfter på Siø. I grøften ved den sydlige cykelsti nær 13,7 km-stenen og videre mod sydøst til vigen over for Siøgård vokser den sammen med bl.a. Tig-ger-Ranunkel (*Ranunculus sceleratus*), Blek Pileurt (*Polygonum lapathifolium* ssp. *pallidum*), Ru Svinemælk (*Sonchus asper*), Tuds-Siv (*Juncus bufonius*) og Sylt-Star (*Carex otrubae*).

Tidlige botaniske undersøgelser af Siø

Gravesen nævner i Fynsbindet i "Oversigt over Botaniske Lokaliteter" **Svend Andersens** artikel "Fra Vemmenæs Odde til Vaarø Enge" i serien "Danske Vegetationsbilleder" i Flora og Fauna, 1932:5. Der omtales dog ingen plantefund fra øen.

I 1963 besøgte **Anfred Pedersen** Siø. Hans floraliste rummer 115 arter, og disse er i min floraliste mærket 1963 (AP).

I 1968 foretag **Arne Larsen**, Bornholm, en rundrejse i Danmark og Norge. I referatet fra et møde i Bornholms Naturhistoriske Forening den 6. marts 1969, da han fortalte om sine oplevelser under rejsen, omtalt i Flora og Fauna 76:123, nævnes fra Siø Strand-Karse (*Lepidium latifolium*). Fundet er i min floraliste mærket "1968 (AL)".

I 1969 botaniserede **Alfred Hansen** på Siø, og han fandt i et vandhul mod vest Rank Dueurt (*Epilobium lamyi*). Iovrigt er det interessant, at arten tilsyneladende har et solidt fodfæste på Siø, idet jeg har fundet den to andre steder. Alfred Hansens fund er mærket "1969 (AH)".


I 1971 gik en af Dansk Botanisk Forenings sommerekskursioner under ledelse af S.-E. Sandermann Olsen til Svendborg-egnen, og på førstedagen, den 3. juli, besøgtes Siø. I ekskursionsreferatet i Botanisk Tidsskrift 67:286-287 er opført 60 arter, som i min floraliste er mærket "1972 (DBF)".

Derudover er der, så vidt vides, ikke andre angivelser om floraen på Siø. Under mine ekskursioner til øen den 28. aug. 1990, 27. april 1992, 25. juni 1992 med Karin Wessberg, 30. april 1993 og 4. aug. 1993 er der set 283 taxa, heraf 50 arter af Mælkebøtte (*Taraxacum*). Disse taxa er i floralisten mærket med et "!" Såfremt en art kun er set ét sted, er stedet angivet. Når en art er set mere end ét sted og under fem steder, er der brugt betegnelsen "bl.a." efterfulgt af en af lokaliteterne. Såfremt en art i mine noteshefter optræder mere end fem gange, er der i de fleste tilfælde brugt hyppighedsangivelsen "alm.". Ialt er der fra Siø nu kendt 320 taxa.

Vedrørende plantenavnene er generelt benyttet Dansk Feltflora, til Mælder (*Atriplex*) dog Pedersen, 1968, og til Brombær (*Rubus*) Pedersen & Schou, 1989.

Alm. Engelskgræs (*Armeria maritima* ssp. *elongata*).

Under Anfred Pedersens besøg på Siø i 1963 fandt han 16 arter, der hverken er set tidligere eller senere. Uddover den afbildede drejer det sig bl.a. om Sand-Løg (*Allium vineale*), Melet Mælte (*Atriplex triangularis*), Slap Annelgræs (*Puccinellia suecica*), Strand-Svingel (*Festuca arundinacea*), Gul Okseøje (*Chrysanthemum segetum*), Kæmpe-Bjørneklo (*Heracleum pubescens*) og Nat-Limurt (*Silene noctiflora*) samt om nogle af de arter, der er omtalt i figurteksten på side 7.



Floraliste

Acer campestre (*Navr*) – 1963 (AP) – bl.a. i lille plantning mod nordvest !

– **pseudoplatanus** (*Ahorn*) – ved vandhul mod øst !

Achillea millefolium (*Alm. Røllike*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. !

Aegopodium podagraria (*Skvalderkål*) – 1963 (AP) – bl.a. på grøftekant ved dæmningen til Tåsinge !

Aesculus hippocastanum (*Hestekastanje*) – hegning ved Siøgård (opvækst) !

Agrimonia eupatoria (*Alm. Agermåne*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – dige ved sydsiden !

– **procera** (*Vellugtende Agermåne*) – dige mellem Siøgård og Tåsinge-dæmningen !

Agrostis stolonifera (*Krybende Hvene*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !

– **tenuis** (*Alm. Hvene*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. !

Alliaria petiolata (*Løgkarse*) – bl.a. på dæmning mod øst !

Allium scorodoprasum (*Skov-Løg*) – bl.a. ved vandhul ved sydøstsiden !

– **vineale** (*Sand-Løg*) – 1963 (AP).

Alopecurus geniculatus (*Knæbøjet Rævehale*) – bl.a. ved vandhul ved møllerne !

– **pratensis** (*Eng-Rævehale*) – lille kær syd for Siøgård !

Anagallis arvensis ssp. **arvensis** (*Rød Arve*) – 1963 (AP) – bl.a. på grøftekant ved sydsiden !

Anchusa arvensis (*Krumhals*) – mark mod øst !

Anemone nemorosa (*Hvid Anemone*) – grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !

Anethum graveolens (*Dild*) – bl.a. på jordburke og i markkanter ved sydsiden (Dild-mark 1992) !

Anthriscus caucalis (*Gærde-Kørvel*) – 1963 (AP).

– **sylvestris** (*Vild Kørvel*) – alm. !

Apera spica-venti (*Vindaks*) – hvedemark mod nordøst !

Arabidopsis thaliana (*Gåsemad*) – bl.a. ved markvej ved sydsiden !

Arctium lappa (*Glat Burre*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant nær husene i øst !

– **nemorosum** ssp. **nemorosum** (*Skov-Burre*) – lille plantning mod nordvest !

Arenaria serpyllifolia var. **tenuis** – 1972 (DBF).

Armeria maritima ssp. **elongata** (*Alm. Engelskgræs*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF).

Armoracia rusticana (*Peberrod*) – dige mod sydøst !

Arrhenatherum elatius (*Alm. Draphavre*) – 1963 (AP) – alm. !

Artemisia maritima (*Strand-Malurt*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – bl.a. på strandoverdrev mod nordvest !

– **vulgaris** (*Grå Bynke*) – 1963 (AP) – alm. (langs landevejen) !

Arum alpinum ssp. **danicum** (*Dansk Ingefær*) – hegning ved Siøgård !

Aster tripolium (*Strand-Asters*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. ved kysten !

Atriplex deltoidea (*Tand-Mælde*) – strandsump mod øst !

– **latifolia** s.str. (*Spydblædt Mælde*) – 1963 (AP) – bl.a. i strandeng mod øst !

– **litoralis** (*Strand-Mælde*) – 1963 (AP) – alm. ved kysten !

– **patula** (*Svine-Mælde*) – 1963 (AP) – bl.a. på strandoverdrev mod nordøst !

– **triangularis** (*Melet Mælde*) – 1963 (AP).

Avena fatua (*Flyve-Havre*) – 1963 (AP) – mark ved Tåsinge-dæmningen !

Ballota nigra ssp. **nigra** (*Rød Tandbæger*) – bl.a. på dige mod sydvest !

Bellis perennis (*Tusindfryd*) – grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !

Beta vulgaris ssp. **maritima** (*Strand-Bede*) – strand mod nordvest !

– – – – **vulgaris** (*Foder-Bede*) – mellem sten på dæmning ved Siøgård !

Betula pubescens (*Dun-Birk*) – lille plantning mod nordvest !

Brassica campestris ssp. **campestris** (*Ager-Kål*) – 1972 (DBF).

– – – – **napus** (*Raps*) – bl.a. i vejkant nær Siøgård !

Bromus hordeaceus ssp. **hordeaceus** (*Blød Hejre*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !

- Bromus hordeaceus ssp. thominii** (*Liggende Hejre*) – 1972 (DBF).
- **sterilis** (*Gold Hejre*) – bl.a. i granplantning ved husene mod øst !
- Cakile maritima ssp. baltica** (*Østersø-Strandsennep*) – bl.a. på strand mod nordøst !
- Calendula officinalis** (*Morgenfrue*) – 1972 (DBF).
- Calystegia sepium** (*Gærde-Snerle*) – 1963 (AP) – bl.a. i rørsump mod øst !
- Campanula rapunculoides** (*Ensidig Klokke*) – bl.a. ved husene i øst !
- Capsella bursa-pastoris** (*Hyrdetaske*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. !
- Cardamine hirsuta** (*Roset-Springklap*) – bl.a. på grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
- Carduus crispus** (*Kruset Tidsel*) – 1963 (AP) – bl.a. på dæmning mod sydøst !
- Carex acutiformis** (*Kær-Star*) – vandhul mod øst !
- **otrubae** (*Sylt-Star*) – bl.a. på grøftekant ved Siøgård !
- Centaurea jacea** (*Alm. Knopurt*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – vejkant ved sydvestsiden !
- Cerastium arvense** (*Storblomstret Hønsetarm*) – 1972 (DBF).
- **fontanum** ssp. **triviale** (*Alm. Hønsetarm*) – bl.a. i vejkant lidt vest for Siøgård !
 - **glomeratum** (*Opret Hønsetarm*) – bl.a. på grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **semidecandrum** (*Femhannet Hønsetarm*) – bl.a. på skrænt ved dæmningen til Langeland !
- Chaerophyllum temulentum** (*Hulsvøb*) – 1963 (AP) – bl.a. ved dæmningen mod øst !
- Chamaenerion angustifolium** (*Gederams*) – skrænt ved dæmningen til Langeland !
- Chamomilla recutita** (*Vellugtende Kamille*) – 1963 (AP) – bl.a. ved vandhul ved sydøstsiden !
- **suaveolens** (*Skive-Kamille*) – 1963 (AP) – bl.a. ved vandhul ved sydøstsiden !
- Chenopodium album** ssp. **album** (*Hvidmelet Gåsefod*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – i haver ved husene mod øst !
- **glaucum** (*Blågrøn Gåsefod*) – vandhul ved sydøstsiden !
- Chrysanthemum coronarium** (*Kron-Okseøje*) – 1972 (DBF).
- **segetum** (*Gul Okseøje*) – 1963 (AP).
- Cichorium intybus** (*Cikorie*) – 1963 (AP) – alm. langs landevejen !
- Cirsium arvense** (*Ager-Tidsel*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. langs landevejen !
- **vulgare** (*Horse-Tidsel*) – 1963 (AP) – bl.a. på strandoverdrev mod nordøst !
- Clematis vitalba** (*Skovranke*) – hegning ved Siøgård !
- Cochlearia anglica** (*Engelsk Kokleare*) – bl.a. på strand ved Tåsinge-dæmningen !
- **danica** (*Dansk Kokleare*) – strandoverdrev mod nordvest !
 - **officinalis** (*Læge-Kokleare*) – 1972 (DBF).
- Conium maculatum** (*Skarntyde*) – bl.a. i strandrørsump mod nordvest !
- Convolvulus arvensis** (*Ager-Snerle*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – bl.a. på grøftekant mellem Siøgård og Tåsinge-dæmningen !
- Conyza canadensis** (*Canadisk Bakkestjerne*) – i mark mod øst !
- Crataegus laevigata** (*Alm. Hvidtjørn*) – dige mod nordvest !
- **monogyna** (*Engriflet Hvidtjørn*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – ved lille kær syd for Siøgård !
- Dactylis glomerata** (*Alm. Hundegræs*) – 1963 (AP) – alm. !
- Daucus carota** ssp. **carota** (*Vild Gulerod*) – bl.a. i vejkant ved sydvestsiden !
- Deschampsia flexuosa** (*Bølget Bunke*) – lille overdrev ved Tåsinge-dæmningen !
- Dipsacus fullonum** (*Gærde-Kartebolle*) – 1972 (DBF) – bl.a. ved afvandingsgrøft ved sydsiden !
- Echinops exaltatus** (*Tidselkugle*) – dæmning mod øst !
- Elytrigia junceiforme** (*Strand-Kvik*) – bl.a. på strand mod nordøst !
- **repens** (*Alm. Kvik*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. !
- Epilobium hirsutum** (*Lådden Dueurt*) – 1963 (AP) – bl.a. i rørsump mod nordvest !
- **lamyi** (*Rank Dueurt*) – 1969 (AH) – bl.a. i vandhul mod øst !
 - **montanum** (*Glat Dueurt*) – bl.a. i kanten af rørsump mod nordvest !
 - **palustre** (*Kær-Dueurt*) – bl.a. i rørsump mod nordvest !
- Equisetum arvense** (*Ager-Padderok*) – 1963 (AP) – bl.a. på grøftekant ved dæmningen til Tåsinge !
- Eranthis hyemalis** (*Eranthis*) – bl.a. under hæk ved husene mod øst !

- Erophila verna** (*Vår-Gæslingebblomst*) – bl.a. på grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
- Euphorbia helioscopia** (*Skærm-Vortemælk*) – bl.a. i vejkant lidt vest for Siøgård !
- Festuca arundinacea** (*Strand-Svingel*) – 1963 (AP).
- **rubra** ssp. **rubra** (*Rød Svingel*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm !
- Ficaria verna** ssp. **verna** (*Alm. Vorterod*) – bl.a. på grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
- Fraxinus excelsior** (*Ask*) – hegnet nær Tåsinge-dæmningen !
- Fumaria officinalis** (*Læge-Jordrøg*) – i Dild-mark nær Siøgård !
- Galeopsis bifida** (*Skov-Hanekro*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – bl.a. i mark ved dæmningen til Tåsinge !
- Galinsoga quadriradiata** (*Kirtel-Kortstråle*) – have ved husene mod øst !
- Galium aparine** (*Burre-Snerre*) – 1963 (AP) – alm. !
- **mollugo** (*Hvid Snerre*) – alm. langs landevejen !
 - **verum** ssp. **verum** (*Gul Snerre*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
- Geranium dissectum** (*Kløftet Storkenæb*) – ved lille kær syd for Siøgård !
- **molle** (*Blødt Storkenæb*) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
 - **pusillum** (*Liden Storkenæb*) – 1963 (AP).
 - **pyrenaicum** (*Pyrenæisk Storkenæb*) – vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
- Geum urbanum** (*Feber-Nellikerod*) – 1963 (AP) – i granplantning ved husene mod øst !
- Glaux maritima** (*Sandkryb*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – bl.a. i vandhul ved sydøstsiden !
- Glechoma hederacea** (*Korsknap*) – bl.a. på grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
- Halimione pedunculata** (*Stilket Kilebæger*) – 1963 (AP).
- Heracleum pubescens** (*Kæmpe-Bjørneklo*) – 1963 (AP).
- **sphondylium** (*Alm. Bjørneklo*) – vejkant ved Siøgård !
- Hippophaë rhamnoides** (*Havtorn*) – lille krat syd for Siøgård !
- Holcus lanatus** (*Fløjlsgræs*) – bl.a. i fugtig lavning ved Tåsinge-dæmningen !
- Honckenya peploides** (*Strandarve*) – 1972 (DBF) – bl.a. på strand nær Tåsinge-dæmningen !
- Hordeum vulgare** (*Alm. Byg*) – ved vandhul ved sydøstsiden !
- Hypericum maculatum** (*Kantet Perikon*) – 1972 (DBF).
- **perforatum** (*Prikbladet Perikon*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant ved sydvestsiden !
- Juncus bufonius** (*Tudse-Siv*) – 1963 (AP) – bl.a. i fugtig lavning nær Tåsinge-dæmningen !
- **conglomeratus** (*Knop-Siv*) – lille kær syd for Siøgård !
 - **effusus** (*Lyse-Siv*) – grøft ved Siøgård !
 - **gerardi** (*Harril*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – bl.a. i strandeng syd for Siøgård !
- Knautia arvensis** (*Blåhat*) – vejkant ved sydvestsiden !
- Lamium amplexicaule** (*Liden Tvetand*) – bl.a. i markkant syd for Siøgård !
- **purpureum** (*Rød Tvetand*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – bl.a. på grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
- Lapsana communis** (*Haremads*) – 1972 (DBF) – bl.a. ved vandhul i lille plantning mod nordvest !
- Lathyrus pratensis** (*Gul Fladbælg*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF).
- Lemna minor** (*Liden Andemad*) – vandhul mod øst !
- Leontodon autumnalis** (*Høst-Borst*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant nær husene i øst !
- Lepidium latifolium** (*Strand-Karse*) – 1963 (AP) – 1968 (AL) – 1972 (DBF) – talrig ved stranden, især mod syd !
- Leucanthemum vulgare** (*Hvid Okseøje*) – 1963 (AP) – vejkant ved sydvestsiden !
- Leymus arenarius** (*Marehalm*) – 1972 (DBF) – bl.a. på strandoverdrev nær Tåsinge-dæmningen !
- Limonium humile** (*Lav Hinddebæger*) – strandeng ved Barhoved mod sydvest !
- **vulgare** (*Tætblomstret Hinddebæger*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF).
- Linaria vulgaris** (*Alm. Torskemund*) – 1963 (AP) – bl.a. på strandoverdrev mod nordvest !
- Lolium multiflorum** (*Italiensk Rajgræs*) – 1972 (DBF).
- **perenne** (*Alm. Rajgræs*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
- Lotus corniculatus** (*Alm. Kællingetand*) – 1963 (AP) – vejrabat over for Siøgård !

- Lotus tenuis** (*Smalbladet Kællingetand*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF).
- Lupinus polyphyllus** (*Mangebladet Lupin*) – vejskrænt nær Tåsinge-dæmningen !
- Lycium barbarum** (*Bukketorn*) – strandoverdrev mod nordøst !
- Lycopus europaeus** (*Sværtevæld*) – bl.a. i rørsump mod nordvest !
- Malus x domestica** (*Sødæble*) – hegning mod nordøst !
- Malva sylvestris** (*Alm. Katost*) – 1963 (AP) – bl.a. på strandoverdrev ved husene i øst !
- Medicago lupulina** (*Humle-Sneglebælg*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
- **sativa** (*Foder-Lucerne*) – 1963 (AP) – bl.a. på grøftekant ved Siøgård !
- Myosotis arvensis** (*Mark-Forglemmigej*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. !
- Narcissus poëticus** (*Pinselilje*) – krat ved Siøgård !
- **pseudonarcissus** – krat ved Siøgård !
- Ononis repens** (*Mark-Krageklo*) – 1972 (DBF).
- Papaver dubium** (*Gærde-Valmue*) – bl.a. på dæmning mod øst !
- **rhoeas** (*Korn-Valmue*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – talrig i marker !
- Parapholis strigosa** (*Spidshale*) – 1963 (AP).
- Petroselinum crispum** var. **crispum** (*Krus-Persille*) – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
- Phragmites australis** (*Tagrør*) – 1963 (AP) – alm. !
- Picea abies** (*Rødgran*) – lille plantning mod nordvest !
- **sitchensis** (*Sitka-Gran*) – lille plantning mod nordvest !
- Plantago lanceolata** (*Lancet-Vejbred*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant nær husene i øst !
- **major** ssp. **intermedia** (*Liden Vejbred*) – 1963 (AP).
- – **major** (*Glat Vejbred*) – 1963 (AP) – alm. !
- **maritima** (*Strand-Vejbred*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – mellem sten på stranden i nordøst !
- **media** (*Dunet Vejbred*) – 1972 (DBF).
- Poa annua** (*Enårig Rapgræs*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. !
- **pratensis** ssp. **angustifolia** (*Smalbladet Rapgræs*) – 1963 (AP).
- – – **pratensis** (*Eng-Rapgræs*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – dæmning syd for Siøgård !
- **trivialis** (*Alm. Rapgræs*) – 1972 (DBF) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
- Polygonum amphibium** (*Vand-Pileurt*) – bl.a. på strand mod nordøst !
- **aviculare** ssp. **aequale** (*Småbladet Vej-Pileurt*) – 1963 (AP).
- – **aviculare** (*Alm. Vej-Pileurt*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. !
- **convolvulus** (*Snerle-Pileurt*) – 1963 (AP) – bl.a. på jordbunke ved sydsiden !
- **cuspidatum** (*Japan-Pileurt*) – mellem sten på dæmning ved Siøgård !
- **dumetorum** (*Vinge-Pileurt*) – 1972 (DBF).
- **lapathifolium** ssp. **lapathifolium** (*Knudet Pileurt*) – fugtig lavning nær Tåsinge-dæmningen !
- – – **pallidum** (*Bleg Pileurt*) – 1963 (AP) – bl.a. i fugtig lavning nær Tåsinge-dæmningen !
- **neglectum** (*Spidsbladet Pileurt*) – 1963 (AP).
- **persicaria** (*Fersken-Pileurt*) – 1963 (AP) – bl.a. i fugtig lavning nær Tåsinge-dæmningen !
- Populus alba** (*Sølv-Poppel*) – bl.a. i hegning mod nordvest !
- Potamogeton natans** (*Svømmende Vandaks*) – 1972 (DBF).
- Potentilla anserina** (*Gåse-Potentil*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. !
- **argentea** ssp. **argentea** (*Alm. Sølv-Potentil*) – 1972 (DBF).
- **reptans** (*Krybende Potentil*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. !
- Primula veris** (*Hulkravet Kodriver*) – lille plantning ved nordsiden !
- Prunus spinosa** (*Slåen*) – 1972 (DBF) – bl.a. i hegning nær Tåsinge-dæmningen !
- Puccinellia distans** (*Udspærret Annelgræs*) – bl.a. i strandeng mod nordøst !
- **maritima** (*Strand-Annelgræs*) – 1963 (AP) – bl.a. i grøft ved sydsiden !
- **suecica** (*Slap Annelgræs*) – 1963 (AP).
- Quercus petraea** (*Vinter-Eg*) – dige ved dæmningen til Langeland !

- Quercus robur** (*Stilk-Eg*) – bl.a. i lille skov mod nordvest !
- Ranunculus repens** (*Lav Ranunkel*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
- **sardous** (*Stivhåret Ranunkel*) – 1963 (AP) – bl.a. ved vandhul ved sydøstsiden !
 - **sceleratus** (*Tigger-Ranunkel*) – 1963 (AP) – bl.a. i grøft ved sydsiden !
- Ribes rubrum** ssp. **sylvestre** (*Have-Ribs*) – nær stranden ved dæmningen til Langeland !
- **uva-crispa** (*Stikkelsbær*) – bl.a. i granplantning ved husene mod øst !
- Rosa canina** ssp. **canina** (*Glat Hunde-Rose*) – 1972 (DBF) – bl.a. i krat ved nordøst-siden !
- **ruginosa** (*Æble-Rose*) – bl.a. i krat ved østsiden !
 - **rubrifolia** (*Kobber-Rose*) – skrænt ved dæmningen til Langeland !
 - **rugosa** (*Rynket Rose*) – 1972 (DBF) – bl.a. i hegning nær Tåsinge-dæmningen !
- Rubus caesius** (*Korbær*) – 1963 (AP) – bl.a. ved lille skov i nordvest !
- **radula** (*Brombær, sect. Rubus*) – bl.a. i hegning ved Tåsinge-dæmningen !
 - **vestitus** (*Brombær, sect. Rubus*) – bl.a. i hegning ved Tåsinge-dæmningen !
- Rumex acetosella** (*Rødknæ*) – vejkant mod øst !
- **crispus** (*Kruset Skræppe*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – alm. !
 - **obtusifolius** (*Butbladet Skræppe*) – dige mod sydøst !
- Ruppia maritima** (*Alm. Havgræs*) – 1963 (AP).
- Salicornia europaea** (*Alm. Salturti*) – 1963 (AP) – bl.a. i fugtig lavning syd for Siøgård !
- Salix cinerea** (*Gråpil*) – strandrørsump mod nordvest !
- **x dasyclados** (*Lådden Pil*) – omkring vandhul nær vej mod øst !
 - **x smithiana** (*Lancet-Pil*) – vandhul mod øst !
 - **viminalis** (*Bånd-Pil*) – omkring vandhul mod nordøst !
- Sambucus nigra** (*Alm. Hyld*) – 1963 (AP) – bl.a. i hegning nær Tåsinge-dæmningen !
- Scirpus maritimus** (*Strand-Kogleaks*) – 1963 (AP) – alm. ved kysten !
- Senecio vernalis** (*Vår-Brandbæger*) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
- **vulgaris** (*Alm. Brandbæger*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
- Silene alba** (*Aften-Pragtstjerne*) – grøftekant nær Siøgård !
- **noctiflora** (*Nat-Limurt*) – 1963 (AP).
- Sinapis arvensis** (*Ager-Sennep*) – bl.a. i dildmark nær Siøgård !

Tætblomstret Hinddebæger (*Limonium vulgare*)
 Begge arter af Hinddebæger er fundet på Siø. Mest interessant er det, at Lav Hinddebæger (*L. humile*) vokser her, idet den er uden for sit danske hovedudbredelsesområde ved bl.a. Samsø, Odense Fjord og Isefjorden, jf. Andersen 1943. På Siø har jeg ikke set Tætblomstret Hinddebæger, som er fundet af både Anfred Pedersen og af deltagerne i Dansk Botanisk Forening ekskursion, hhv. i 1963 og 1972. Lav Hinddebæger vokser på den meget smalle strand og i det smalle strandengsområde på ydersiden af dæmningen lidt øst for Barhoved i sydvest.



- Sisymbrium officinale** (*Rank Vejsennep*) – bl.a. på jordbunke ved sydsiden !
- Solanum dulcamara** (*Bittersød Natskygge*) – rørsump mod nordvest !
- **nigrum** ssp. **nigrum** (*Sort Natskygge*) – på affaldshenkastning på strandoverdrev mod øst !
- Solidago gigantea** (*Sildig Gyldenris*) – lille krat ved dæmningen mod sydøst !
- Sonchus arvensis** (*Ager-Svinemælk*) – 1963 (AP) – bl.a. i rørsump mod nordvest !
- **asper** (*Ru Svinemælk*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant ved sydvestsiden !
- **oleraceus** (*Alm. Svinemælk*) – 1963 (AP) – bl.a. på dæmning mod øst !
- **palustris** (*Kær-Svinemælk*) – nær stranden ved dæmningen til Langeland !
- Sorbus intermedia** (*Selje-Røn*) – bl.a. i lille plantning mod nordvest !
- Sparganium erectum** s.lat. (*Grenet Pindsvineknop*) – vandhul på mark mod øst !
- Spergula arvensis** (*Alm. Spergel*) – 1963 (AP).
- Spergularia marina** (*Kødet Hindeknæ*) – 1963 (AP) – bl.a. ved vandhul ved sydøstsiden !
- **media** (*Vingefrøet Hindeknæ*) – 1963 (AP).
- Stachys palustris** (*Kær-Galtetand*) – rørsump mod nordvest !
- **sylvatica** (*Skov-Galtetand*) – lille krat mod sydøst !
- Stellaria media** (*Alm. Fuglegræs*) – 1963 (AP) – alm. !
- Suaeda maritima** (*Strandgåsefod*) – 1963 (AP) – bl.a. i strandrørsump mod nordvest !
- Symporicarpos rivularis** (*Alm. Snebær*) – på jordbunke over for Siøgård !
- Tanacetum vulgare** (*Rejnsfan*) – 1963 (AP) – alm. langs landevejen !
- Taraxacum**, sect. **Hamata** (*Krogfliget Mælkebøtte*):
- Taraxacum fusciflorum** – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
- Taraxacum**, sect. **Ruderalia** (*Fandens Mælkebøtte*):
- Taraxacum acervatum** – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
- **acroglossum** – bl.a. i vejkant mellem Siøgård og Tåsinge-dæmningen !
 - **adiantifrons** – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **adjunctum** – bl.a. i vejkant/på grøftekant ved 13,7 km-stenen vest for Siøgård !
 - **aequilobum** – vejkant/grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **alatum** – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **amplum** – bl.a. i vejkant mellem Siøgård og Tåsinge-dæmningen !
 - **ancistrolobum** – vejkant/skrænt ved Siøgård !
 - **angustisquameum** – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **borgvallii** – vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **caloschistum** – vejkant mellem Siøgård og Tåsinge-dæmningen !
 - **christiansenii** – vejkant/grøftekant ved 13,7 km-stenen vest for Siøgård !
 - **cyanolepis** – bl.a. i vejkant/på skrænt ved Siøgård !
 - **distinctilobum** – vejkant/grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **ekmanii** – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **exacutum** – vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **fasciatum** – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **huelphersianum** – vejkant/grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **incisum** – vejkant/grøftekant ved 13,7 km-stenen vest for Siøgård !
 - **kjellmanii** – vejkant mellem Siøgård og Tåsinge-dæmningen !
 - **laciniosifrons** – vejkant ved broen til Langeland !
 - **laeticolor** – vejkant/grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **leptodon** – vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **ligerinum** – bl.a. i vejkant/på skrænt ved Siøgård !
 - **lingulatum** – vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **mimulum** – bl.a. i vejkant mellem Siøgård og Tåsinge-dæmningen !
 - **nigrescens** – bl.a. i vejkant ved broen til Langeland !
 - **obliquilobum** – vejkant/grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
 - **oinopolepis** – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !

Taraxacum ostenfeldii – vejkant ved Tåsinge-dæmningen !

- **piceatum** – vejkant mellem Siøgård og Tåsinge-dæmningen !
- **planum** – vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
- **polyodon** – vejkant/skrænt ved Siøgård !
- **pseudoretroflexum** – bl.a. i vejkant/på skrænt ved Siøgård !



Taraxacum wiinstedtii

er blandt de 26 arter, der i 1976 blev beskrevet af Hans Øllgaard i Botaniska Notiser. Af disse har jeg på Siø, udover den afbildede, også fundet *T. distinctilobum*. Ikke færre end tre ubeskrevne arter er der fundet på øen. Disse vil i nær fremtid blive beskrevet af Hans Øllgaard med navnene *T. ad-junctum*, *T. nigrescens* og *T. ristingense*. Af mindre almindelige og sjældne arter er der fundet *T. ligerinum* og *T. oinopolepis*. Årsagen til det forholdsmaessigt "lille" antal Mælkebøtter, 52 arter, kun repræsenteret af to sektioner (sect. **Hamata** & sect. **Ruderalia**), ligger formentlig i, at det på Siø stort set kun er langs den stærkt trafikerede hovedvej A-9, at der vokser Mælkebøtter. Der er f.eks. ikke fundet arter tilhørende vores to sektioner af Sand-Mælkebøtter (*Taraxacum* sect. **Ery-throsperma** & *T.* sect. **Obliqua**). Iovrigt er *Taraxacum wiinstedtii* af Hans Øllgaard opkaldt efter den danske botaniker Knud Wiinstedt.

- Taraxacum purpureum** – vejkant/grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
 – **rhodopodium** – vejkant/skrænt ved Siøgård !
 – **ristingense** – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 – **scotiniforme** – vejkant ved broen til Langeland !
 – **sellandii** – bl.a. i vejkant mellem Siøgård og Tåsinge-dæmningen !
 – **semiglobosum** – bl.a. i vejkant ved broen til Langeland !
 – **subhuelphersianum** – vejkant/grøftekant ved 13,7 km-stenen vest for Siøgård !
 – **stereodes** – vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 – **tenebricans** – vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
 – **unguifrons** – vejkant/grøftekant ved 13,7 km-stenen vest for Siøgård !
 – **valens** – bl.a. i vejkant/på skränt ved Siøgård !
 – **vanum** – vejkant/grøftekant ved 13,7 km-stenen vest for Siøgård !
 – **vastisectum** – bl.a. i vejkant/på skränt ved Siøgård !
 – **wiinstedtii** – vejkant/grøftekant ved dæmningen til Siø !
 – **xanthostigma** – bl.a. i vejkant ved Tåsinge-dæmningen !
- Thlaspi arvense** (*Alm. Pengeurt*) – bl.a. i haver ved husene mod øst !
- Torilis japonica** (*Hvas Randfrø*) – 1972 (DBF) – bl.a. i vejkant nær Siøgård !
- Tragopogon pratensis** ssp. **pratensis** (*Eng-Gedeskæg*) – vejkant ved sydvestsiden !
- Trifolium campestre** (*Gul Kløver*) – bl.a. i vejkant ved sydvestsiden !
- **dubium** (*Fin Kløver*) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
 – **hybridum** ssp. **hybridum** (*Alsite-Kløver*) – 1963 (AP) – vejkant nær Tåsinge-dæmningen !
 – **pratense** (*Rødkløver*) – bl.a. i vejkant ved Siøgård !
 – **repens** (*Hvidkløver*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
- Triglochin maritimum** (*Strand-Trehage*) – 1963 (AP) – bl.a. i grøft ved sydsiden !
- Tripleurospermum inodorum** (*Lugtløs Kamille*) – 1963 (AP) – bl.a. på strandoverdrev mod nordøst !
- **maritimum** ssp. **salinum** (*Alm. Strandkamille*) – 1963 (AP) – bl.a. på strand ved Tåsinge-dæmningen !
- Triticum aestivum** (*Alm. Hvede*) – grøftekant ved Siøgård !
- Tulipa x cult.** (*Have-Tulipan*) – vejkant mod øst !
- Tussilago farfara** (*Følfod*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – bl.a. på grøftekant ved dæmningen mod Tåsinge !
- Typha angustifolium** (*Smalbladet Dunhammer*) – vandhul mod øst !
- Ulmus** sp. (*Elm*) – bl.a. i hegnet ved nordvestsiden !
- Urtica dioica** (*Stor Nælde*) – 1963 (AP) – bl.a. i lille plantning mod nordvest !
- Valerianella locusta** (*Tandsri Vårsalat*) – bl.a. på grøftekant ved Tåsinge-dæmningen !
- Veronica arvensis** (*Mark-Ærenpris*) – alm. !
- **chamaedrys** (*Tveskægget Ærenpris*) – lille plantning mod nordvest !
 – **hederifolia** ssp. **hederifolia** (*Vedbend-Ærenpris*) – bl.a. på grøftekant ved dæmningen til Tåsinge !
 – **persica** (*Storkronet Ærenpris*) – 1963 (AP) – 1972 (DBF) – bl.a. i haver ved husene i øst !
- Vicia angustifolia** (*Smalbladet Vikke*) – bl.a. i vejkant ved sydvestsiden !
- **cracca** (*Muse-Vikke*) – 1963 (AP) – bl.a. i vejkant ved Siøgård !
 – **hirsuta** (*Tofrøet Vikke*) – bl.a. i vejkant ved vigen ved sydvestsiden !
- Viola arvensis** (*Ager-Stedmoderblomst*) – bl.a. i mark ved dæmningen til Langeland !
- **odorata** (*Marts-Viol*) – bl.a. under hække ved husene mod øst !
- Vulpia myuros** (*Stor Væselhale*) – mark og markkant ved Langelandsbroen !
- Zannichellia palustris** (*Vandkrans*) – 1972 (DBF) – på lavt vand omkring øen !
- Zostera marina** (*Alm. Bændeltang*) – 1972 (DBF).

Citeret litteratur

- Andersen, A.**, 1943: Pyrolaceernes og Plumbaginaceernes Udbredelse i Danmark. TBU nr. 12. – Bot. Tids. 47: 123–142 + udbredelseskort.
- Andersen, Sv.**, 1932: Danske Vegetationsbilleder 7. – Fra Vemmenæs Odde til Vaarø Enge. – Flora og Fauna 38: 5–9.
- Darre, M.J.**, 1922: Sognebeskrivelser og Fortegnelse over de Skyldkredse og Herreder, hvortil de enkelte Sogne i Svendborg Amt hører i D. Bruun: Danmark – Land og Folk IV: 225–259. – Kjøbenhavn og Kristiania.
- Friis, A.**, 1962. De Danskes Øer I: 76–79. – København.
- Gravesen, P.**, 1979: Oversigt over Botaniske Lokaliteter. 2. Den fynske Øgruppe: 229. – Miljøministeriet. – København.
- Hansen, A.**, 1951: Udbredelsen af Caprifoliaceae, Adoxaceae, Dipsacaceae og Cucurbitaceae i Danmark. TBU nr. 17. – Bot. Tids. 47: 481–502 + udbredelseskort.
– 1972: Nye floristiske fund og jagttagelser, mest fra 1969 og 1970. – Bot. Tids. 67: 166–173.
- Hansen, K. (red.)**, 1991: Dansk Feltflora, 5. opl. – København.
- Hvem–Hvad–Hvor**, 1946: 144. – København.
- Larsen, A.**, 1970: Foreningsmeddelelser fra Bornholms Naturhistoriske Forening 6.3. 1969. – Flora og Fauna 76: 123.
- Lund, F.C.**, 1823: Øen Thorseng. – Odense.
- Pedersen, A.**, 1968: Nogle kritiske, danske Atriplex–arter. – Bot. Tids. 63: 289–303.
– & J.C. Schou, 1989: Nordiske Brombær. – Botanisk Institut, Århus.
- Sandermann Olsen, S.–E.**, 1972: Ekskursion til Svendborg–egnen den 3.–4. juli 1971. – Bot. Tids. 67: 286–288.
- Wessberg, E.**, 1993: Øland, ø–flora nr. 52. – Randers.
- Wiinstedt, K.**, 1943: Cyperaceernes Udbredelse i Danmark. TBU nr. 13. – Bot. Tids. 47: 143–244 + udbredelseskort.
- Aalbæk Jensen, E.**, 1982: Livet på Øerne. Langelændere og Folk fra Svendborgsund: Diverse sider. – København.

Tak

Universitetslektor Alfred Hansen og seminarielektor Anfred Pedersen takkes varmt for deres bemærkninger til manuskriptet. Alfred Hansen og Anfred Pedersen takkes endvidere for deres hjælp i forbindelse med bestemmelse eller verifikation af planteindsamlinger fra Siø og lærer Hans Øllgaard for god hjælp i forbindelse med Mælkebøtte–bestemmelserne, og fordi jeg måtte bruge tegningen af Taraxacum wiinstedtii. Lærer Jens Chr. Schou takkes på det bedste, fordi hans tegninger måtte benyttes i denne ø–flora. For velvillig økonomisk hjælp takkes Fyns Amtskommune, Landskabsafdelingen.

Erik Wessberg
Sandagervej 13
Assentoft
8900 Randers

HIDTIDIGE Ø-FLORAER

Hidtil er der i ø-floraserien udarbejdet ø-floraer for følgende øer, tidligere øer eller ø-grupper.
(BL) er Bernt Løjtnant og (EW) Erik Wessberg.

1. Anholt (1981). – (BL & EW). 50 sider.
2. Hjarnø i Horsens Fjord (1981). – (BL & EW). 26 sider.
3. Treskelbakkeholm i Mariager Fjord (1983). – (BL & EW). 16 sider.
4. Klosterholm og Startøtterne i Nibe Bredning (1984). – (BL & EW). 24 sider.
5. Mellemøldene i Randers Fjord ved Udbyhøj (1984). – (BL & EW). 17 sider.
6. Pletten (Store Plet) i Mariager Fjord (1984). – (BL & EW). 14 sider.
7. Alrø i Horsens Fjord (1985). – (EW). 37 sider.
8. Møgelø i Julsø syd for Silkeborg (1985). – (EW). 19 sider.
9. Lille Plet i Mariager Fjord nord for Pletten (1985). – (BL & EW). 12 sider.
10. Paradisøerne i Borre Sø syd for Silkeborg (1985). – (EW). 19 sider.
11. Alrø Poller i Horsens Fjord sydøst for Alrø (1985). – (EW). 15 sider.
12. Tange Ø i Tange Sø (1985). – (EW). 13 sider.
13. Hov Røn nordøst for Gyllingnæs (1986). – (BL & EW). 17 sider.
14. Svanegrunden nordøst for Endelave (1986). – (BL). 20 sider.
15. Vår Holm og Kyø Holm i Limfjorden ved Nibe (1986). – (EW). 20 sider.
16. Fjandø i Nissum Fjord (1986). – (EW). 21 sider.
17. Egholm i Limfjorden sydvest for Mors (1986). – (BL & EW). 44 sider.
18. Søby Rev øst for Gyllingnæs (1986). – (BL & EW). 15 sider.
19. Agerø i Limfjorden sydvest for Mors (1987). – (EW). 34 sider.
20. Stenrevet i Randers Fjord vest for Udby (1987). – (EW). 13 sider.
21. Lundø mellem Skive Fjord og Lovns Bredning (1987). – (EW). 41 sider.
22. Stenklipperne i Limfjorden ved Agerø (1988). – (EW). 14 sider.
23. Odpold i Randers Fjord nord for Stenrevet (1988). – (BL & EW). 12 sider.
24. Livø i Limfjorden (1988). – (BL & EW). 75 sider.
25. Svinø i Gamborg Fjord sydøst for Middelfart (1989). – (EW). 33 sider.
26. Lilleø, Bregnø og Alø i Julsø syd for Silkeborg (1989). – (EW). 20 sider.
27. Store og Lille Rotholm i Risgårde Bredning nord for Hvalpsund (1989). – (EW). 21 sider.
28. Sankt Thomas i Skanderborg Sø (1990). – (EW). 11 sider.
29. Æbelø i Skanderborg Sø (1990). – (EW). 14 sider.
30. Kalvø i Skanderborg Sø (1990). – (BL & EW). 14 sider.
31. Mågeøerne ved Bogense (1991). – (BL & EW). 15 sider.
32. Tunø ved Samsø (1991). – (BL & EW). 56 sider.
33. Hornsgård Holm og Tøtten i Limfjorden nordvest for Nibe (1991). – (EW). 14 sider.
34. Torø i Lille Bælt syd for Assens (1991). – (EW). 23 sider.
35. Lindholm i Limfjorden øst for Thyholm (1991). – (BL & EW). 18 sider.
36. Kalvø i Genner Bugt (1991). – (EW). 19 sider.
37. Arup Holm i Limfjorden ved Feggesund (1991). – (BL & EW). 17 sider.
38. Barsø i Lille Bælt nordvest for Als (1991). – (EW). 39 sider.

39. Venø i Limfjorden sydøst for Thyholm (1992). – (EW). 42 sider.
40. Bågø i Lille Bælt nordvest for Assens (1992). – (EW). 55 sider.
41. Gjøl i Limfjorden nordvest for Ålborg (1992). – (EW). 41 sider.
42. Ejlinge sydøst for Æbelø ved Bogense (1993). – (EW). 18 sider.
43. Dræt syd for Æbelø ved Bogense (1993). – (EW). 19 sider.
44. Leammer i Odense Fjord ved Hofmansgave (1993). – (EW). 18 sider.
45. Kyholm i Odense Fjord syd for Leammer (1993). – (EW). 12 sider.
46. Ægholm i Odense Fjord ved Hofmansgave (1993). – (EW). 12 sider.
47. Trindelen nord for Leammer i Odense Fjord (1993). – (EW). 13 sider.
48. Holmene i Odense Fjord ved Drejet (1993). – (EW). 12 sider.
49. Fur i Limfjorden (1993). – (EW). 63 sider.
50. Piggen i Randers Fjord (1993). – (BL & EW). 15 sider.
51. Drætteholm ved Bogense (1993). – (EW). 13 sider.
52. Øland ved Limfjorden vest for Gjøl (1993). – (EW). 64 sider
53. Siø mellem Tåsingø og Langeland (1993). – (EW). 24 sider.

FREMTIDIGE Ø-FLORAER

Siden 1983 er der foretaget floristiske undersøgelser – med henblik på udarbejdelse af floralister – på følgende øer, tidligere øer eller ø-grupper – regnet fra nord:

Rønnerne mellem Frederikshavn og Strandby.

Hornfiskrøn syd for Læsø.

Fuglholm i Limfjorden mellem Jegindø og Agerø.

Rønland øst for Harboør Tange.

Hjelm sydøst for Ebeltoft.

Jegindø i Limfjorden øst for Thyholm.

Sejerø sydvest for Sjællands Odde.

Lindholm nordøst for Stavns Fjord ved Samsø.

Kyholm vest for Lindholm i Stavns Fjord.

Kolderne i Stavns Fjord ved Samsø.

Ægholm i Stavns Fjord ved Samsø.

Sværm i Stavns Fjord ved Samsø.

Mejlesholm i Stavns Fjord ved Samsø.

Hjortholm i Stavns Fjord ved Samsø.

Eskeholm i Stavns Fjord ved Samsø.

Brokold i Stavns Fjord ved Samsø.

Vorsø i Horsens Fjord.

Vorsø Kalv i Horsens Fjord sydvest for Vorsø.


Orø i Isefjorden.

Nekselø i Nekselø Bugt.

Endelave sydvest for Samsø.

Mejlø ved Hindsholm.
Bogø ved Hindsholm.
Enø ved Bogø.
Vejlø ved Hindsholm.
Vejlø Kalv ved Hindsholm.
Flakfortet i Øresund nord for Saltholm.
Ølsemagle Revle i Køge Bugt.
Tornø i Odense Fjord.
Romsø i Store Bælt.
Årø i Lille Bælt nordvest for Assens.
Agersø i Store Bælt sydvest for Skælskør.
Glænø sydøst for Skælskør.
Ormø i Holsteinborg Nordøst for Glænø.
Enø ved Karrebæksminde.
Helnæs nordvest for Fåborg.
Vigø i Helnæs Bugt nordvest for Fåborg.
Horsehoved i Helnæs Bugt sydvest for Vigø.
Illum i Helnæs Bugt sydvest for Horsehoved.
Knolden ved sydøstsiden af Horne Land.
Bjørnø syd for Fåborg.
Knudshoved nordvest for Vordingborg.
Store og Lille Svelmø mellem Fåborg og Svendborg.
Thurø sydøst for Svendborg.
Masnedø ved Vordingborg.
Skarø vest for Tåsinge.
Drejø sydvest for Skarø.
Store og Lille Rallen ved sydøstsiden af Tåsinge.
Strynø sydvest for Rudkøbing.
Lilleø i Smålandsfarvandet nord for Askø.
Askø i Smålandsfarvandet nord for Bandholm.
Langø i Lindelse Nor syd for Rudkøbing.
Lindø øst for Langø i Lindelse Nor.
Kalvø i Guldborgsund syd for Nykøbing.
Christiansø ved Bornholm.
Frederiksø ved Bornholm.

NB: Alle oplysninger om plantefund fra disse øer har stor interesse.



●: Øer, for hvilke der er udarbejdet floralister.

○: Øer, for hvilke floralister er under udarbejdelse. I øvrigt henvises til de 3 foregående sider.